

Oxymetazoline 鼻噴製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Oxymetazoline HCl	Sindecon®	醫鼻易噴鼻液	0.5 毫克/毫升； 10 毫升/瓶

- ◆ **用途**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

急性鼻炎、過敏性鼻炎、血管舒縮性鼻炎、鼻竇炎、鼻咽炎

- ◆ **用量與用法**

請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

藥液充填：

第一次使用或久未使用請先試壓：

取下透明瓶蓋。將食指和中指放在噴霧劑瓶的噴嘴兩側，而拇指放在瓶底上。用力按壓直到有微細噴霧狀藥劑噴出為止。

使用方式：

1. 將鼻子擤乾淨，頭朝下，使噴霧劑瓶朝向鼻後腔(勿朝向鼻中隔)。
2. 以手指壓住另一個鼻孔，用拇指穩穩地快速完全按壓瓶子，同時緩緩吸氣。
3. 另一個鼻孔則重複相同動作。
4. 如果每個鼻孔須噴一次以上，則重複 1-3 步驟。
5. 用畢後，以乾的面紙擦拭噴嘴後，將瓶蓋置回噴霧劑瓶上。
6. 給藥後 15 分鐘內，請勿擤鼻涕。

噴頭清潔：

1. 每次用畢以乾的面紙擦拭噴嘴再蓋回保護蓋。
2. 定期清洗白色噴嘴：移除透明保護蓋並向上拔出白色噴嘴，以水清洗白色噴嘴及保護蓋，待其風乾後再裝回原位。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

曾因本藥成分引起過敏的人。

- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，不可服用兩倍劑量。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 儲存於室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

- ◆ **注意事項：**

1. 除非醫師指示，六歲以下孩童不建議使用本品。
2. 本品不建議長期使用，使用 3 天後若症狀未緩解，請回診請教醫師。太常使用此藥或使用時長超過指示期間，可能會導致鼻塞再度發作或惡化。
3. 噴鼻器請勿與他人共用，以免造成交叉感染。
4. 請遵照醫師指示之用法用量使用，不可過量。過量使用可能會起灼熱及針刺感、螫傷、打噴嚏等。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/7/23 修訂】

BTC00EO07-02

Oxymetazoline 鼻噴製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Oxymetazoline HCl	Sindecon [®]	醫鼻易噴鼻液	0.5 毫克/毫升； 10 毫升/瓶

5. 使用本品後可能會有局部刺激感和灼熱感、口乾、喉嚨乾、反彈性鼻塞、鼻炎、打噴嚏的情形發生，若症狀持續且嚴重，請回診告知醫師。
6. 若懷孕或計畫懷孕、哺乳、心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、或攝護腺肥大引起排尿困難疾病病史，請先告知醫師。
7. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - (1) 若有任何不適情況產生。
 - (2) 自覺狀況沒有改善或更惡化。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏反應：蕁麻疹、臉或手腫脹、嘴或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
局部刺激感和灼熱感、打噴嚏、口乾、喉嚨乾、反彈性鼻塞。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/7/23 修訂】

BTC00EO07-02