

Fluticasone furoate 鼻噴製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Fluticasone furoate	Avamys®	艾敏釋鼻噴劑	27.5 微克/噴； 120 噴/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療過敏性鼻炎。可幫助減緩如鼻塞、流鼻水、鼻子癢、打噴嚏的症狀。


- ◆ **用量與用法：**

- 藥液充填：**

第一次使用前，或使用後蓋子沒有蓋回時，請用力搖勻鼻噴劑約 10 秒鐘後，對空按壓至少六次，直到均勻霧氣噴出。

- 使用步驟：**

1. 每次使用前都必須用力搖勻鼻噴劑約 10 秒鐘
2. 取下蓋子。
3. 使用前請先擤鼻涕並清潔鼻孔。
4. 將頭稍微往前傾，垂直向上拿著藥瓶，將噴嘴置入於其中一邊鼻孔。
(將噴嘴末端稍為向外，離開鼻中隔，有助於藥物達到鼻孔內正確部位)
5. 在吸氣時按壓 1 次按鈕，將藥品噴入鼻中。
6. 移出噴嘴，並由嘴巴呼氣。
7. 噴藥於另一邊鼻孔時，請重複步驟 4-6。
8. 若每邊鼻孔必須使用兩次，請重複步驟 4-7。
9. 用畢，請用乾燥面紙或紙巾擦拭噴嘴和蓋子內側，並蓋回蓋子。



- 噴頭清潔：**

1. 每次使用完畢後請用乾燥面紙或紙巾擦拭噴嘴和蓋子內側，請勿用水清潔。
2. 請勿使用別針或任何利器在噴嘴上。
3. 清潔完畢請立即蓋回蓋子，以防塵及防止噴嘴阻塞

- 噴不出藥液時：**

1. 透過瓶身窗格察看是否仍有剩餘藥水。
2. 檢查鼻噴劑是否有損壞。
3. 疑似噴嘴阻塞時，請勿以別針或任何利器清潔，嘗試以上述充填藥液方式(用力搖勻鼻噴劑後，對空按壓數次直到均勻霧氣噴出)，重新備藥。
4. 若仍無法正常運作，或噴出非微細的噴霧(如射出液體)，請回診重新取得藥物。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

對本藥品任何一種成分過敏者。

- ◆ **忘記用藥時該如何處理？**

想起時儘快使用；若接近下次服藥時間，按時使用下次劑量即可，千萬不可使用兩倍劑量。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 開口朝上放置並蓋好蓋子。
2. 儲存於室溫 30°C 以下，避免直接曬到太陽。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

Fluticasone furoate 鼻噴製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Fluticasone furoate	Avamys®	艾敏釋鼻噴劑	27.5 微克/噴； 120 噴/瓶

◆ 注意事項：

1. 因本藥非常黏稠，首次使用必須將鼻噴劑用力搖勻約 10 秒後才能液化，而後才能以細微噴霧狀被噴出。
2. 鼻噴劑用畢，請蓋回蓋子，如此才能防塵、保持瓶內壓力，並防止噴嘴堵塞。當蓋子蓋上時可防止瓶身的按鈕被意外壓下而噴出藥水。
3. 使用藥品期間應避免與傳染性患者接觸（例如：水痘、麻疹）。
4. 本藥可能需要好幾天才能達到最佳療效，若症狀持續未改善或惡化，請立即回診。
5. 避免將本藥噴入眼睛，若不小心接觸到，請立即以清水沖洗。
6. 所有您正在服用的藥品，包括處方藥、非處方藥、維生素及中草藥，特別是含有 ritonavir 的藥品，請先告知醫師。
7. 如果您懷孕或計劃懷孕、餵母乳、最近鼻手術或鼻受傷、肝病、眼疾、感染性疾病，請先告知醫師。
8. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏：蕁麻疹、紅腫、呼吸困難、嘴唇、舌或臉腫脹。
 - 鵝口瘡：口腔或喉嚨發紅或有白斑。
 - 鼻中隔穿孔：鼻結痂、流鼻血、流鼻水、呼吸有哨聲。
 - 感染：發燒、持續性疼痛、發冷、喉嚨痛、噁心嘔吐。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭痛、鼻或喉嚨刺激、鼻出血、咳嗽、視力改變。