

## Salmeterol/Fluticasone propionate 吸入劑衛教單張

商品名	中文名
Seretide® 50 Evohaler	使肺泰 50 優氟吸入劑

### ◆ 組成：

一次劑量含支氣管擴張劑 Salmeterol 25mcg 及類固醇 Fluticasone propionate 50mcg，每瓶含 120 次劑量。

### ◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡) 治療氣喘。

### ◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)： 對本藥任何一種成分有過敏者。

### ◆ 用量與用法：

初次使用之前，應先充分搖動噴霧器，並且對空氣試噴數下，直到劑量視窗顯示為“120”。超過一個星期未使用，應充分搖動噴霧器，先對空氣試噴 2 下後再使用。

#### 使用步驟：


1. 每次使用時先上下搖動吸入器使藥品充分混合，移去吸口蓋，將容器底部朝上。
2. 盡量吐氣，然後將吸口置於齒間，緊閉雙唇，但不要咬它。
3. 開始緩慢深深吸氣的同時按壓吸入器以釋出藥液，保持穩定且深的吸氣動作。
4. 擤住呼吸並將吸入器移開，擤住呼吸時間愈久愈好，直到感到不舒服為止(約 5-10 秒)。
5. 如果需要使用第二個劑量，大約等 30 秒後再重複 2-4 步驟。
6. 之後，以清水漱口並將漱口水吐出。
7. 用後蓋回吸口蓋。

#### 吸入器清潔：

1. 一個星期至少清潔一次。
2. 請勿將金屬罐自塑膠外殼中取出，以乾布、面紙或棉布將吸嘴與塑膠外殼之內外擦拭乾淨。不要將金屬罐放入水中。

#### 餘藥確認：

1. 金屬罐外附有計數器，可以顯示剩餘劑量。剩餘劑量數可從塑膠啟動器背面的視窗讀取。吸入器可噴 120 次。
2. 當視窗顯視為“20”時，應回診取得新的吸入劑。
3. 當視窗顯視為“0”時，不可在使用，因為此時吸入劑無法噴出足夠劑量的藥霧。



### ◆ 藥品儲存：

1. 存放在 30°C 以下的乾燥處，避免直接日曬，吸入器不可冷凍。
2. 使用後應將吸口蓋壓緊蓋好。
3. 即使容器明顯是空的，仍應避免重擊、破壞或燃燒容器。

### ◆ 忘記用藥時該如何處理？

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，不可服用兩倍劑量。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/8/9 修訂】

BTC00EQ10-02

### Salmeterol/Fluticasone propionate 吸入劑衛教單張

商品名	中文名
Seretide® 50 Evohaler	使肺泰 50 優氟吸入劑

◆ **注意事項：**

1. 本藥為每日使用維持性支氣管擴張劑，不可用於急救治療，亦不得用以緩解急性症狀。
2. 對罹患嚴重心臟疾病的患者，若出現胸痛或心臟病惡化的症狀，應立即停藥就醫。
3. 若發生支氣管痙攣，急性且快速惡化的呼吸困難時，應立即停藥就醫。
4. 每次使用完吸入劑後需漱口，避免口腔喉嚨念珠菌感染(鵝口瘡)。若口腔或喉嚨發紅或有白苔，請告知醫師。
5. 不可驟然停藥，自行停藥可能會導致病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品，應在醫師監督下逐漸降低劑量。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
  - 嚴重過敏。
  - 胸痛、胸悶、呼吸困難加劇。
  - 皮膚顏色變化、容易瘀傷、肌肉無力、臉圓或浮腫。
  - 眼痛或視力改變。
  - 快速、劇烈或不均勻的心跳。
  - 發燒、發冷、咳嗽、口咽痛、身體酸痛。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

心悸、頭痛、顫抖、咽喉輕微刺激、聲音嘶啞/發音困難、咳嗽、嘶啞、口腔或喉嚨有瘡或白斑、肌肉痙攣、關節痛。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/8/9 修訂】

BTC00EQ10-02