

Budesonide/Formoterol turbuhaler 吸入製劑衛教單張

商品名	中文名
Symbicort® Turbuhaler	吸必擴都保吸入器

◆ 組成：

一次劑量含類固醇 Budesonide 160mcg 及支氣管擴張劑 Formoterol 4.5mcg，每瓶含 120 次劑量。

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

氣喘或慢性阻塞性肺部疾病的治療。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

對本藥、其賦形劑成分或乳糖 (本藥含有少量奶蛋白)過敏者。

◆ 用量與用法：

請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

使用方式：

新的吸入器請先完成準備動作：

1. 將吸入器之紅色轉鈕朝下，旋轉打開瓶蓋，瓶子直立往中間握住，不要握住吸嘴。
2. 旋轉紅色轉鈕，往右邊轉到最大程度(即不能再轉為止)，再往左轉到最大程度，聽到“喀”一聲。
3. 在重複一次步驟 2，此時即完成準備動作。


之後每次使用步驟：

1. 將吸入器之紅色轉鈕朝下，旋轉打開瓶蓋，瓶子直立往中間握住，不要握住吸嘴。
2. 旋轉紅色轉鈕，往右邊轉到最大程度(即不能再轉為止)，再往左轉到最大程度，聽到“喀”一聲，此時即完成一次劑量的充填。
3. 呼氣，但不要對著吸嘴呼氣。
4. 將吸嘴輕置於齒間，含住吸嘴閉上嘴唇，不要咬住吸嘴，**用力快速的**深深吸氣。
5. 移開吸嘴，閉氣 5-10 秒再呼氣。
6. 如果處方劑量超過 1 次，請於 1-2 分鐘後重覆 2~5 步驟。
7. 用水漱口，漱口水不要吞下。

清潔方式：

定期(每週一次)用乾布擦拭吸嘴外測；不要用水或液體清潔吸嘴。

餘藥確認：

1. 劑量指示窗會告訴您吸入器中剩下多少劑量，當劑量滿載時是從 120 開始。
2. 劑量指示窗每隔 10 次劑量才會改變一次，當出現 10 且紅底時表示藥物所剩不多，請回診請醫師開立新的一瓶。
3. 當劑量顯示視窗出現 0 時，轉鈕可能仍可以旋轉，但此時已不含藥物，請不要再使用。搖動吸入瓶可聽到聲音並不是由藥物產生而是乾燥劑。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/7/8 修訂】

BTC00EQ12-02

Budesonide/Formoterol turbuhaler 吸入製劑衛教單張

商品名	中文名
Symbicort® Turbuhaler	吸必擴都保吸入器

◆ 藥品儲存：

1. 30°C 以下並蓋緊瓶蓋儲存，避光、避濕及避熱，不要冷凍。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，不可使用兩倍劑量。

◆ 注意事項：

1. 因一次所投與的粉末量非常少，在吸入後可能無法嚐知其味。如果您依照指示使用，可確信所需藥量已吸入。
2. 在吸入劑量之前，若您誤做了不只一次裝填藥物的動作(即步驟2)，您仍然只會吸入一次劑量；然而，劑量視窗的數字會隨著裝填的劑量次數而減少。
3. 如要停止治療，建議以逐漸降低劑量之方式，不應突然停藥。
4. 對罹患嚴重心臟疾病的患者，若出現胸痛或心臟病惡化的症狀，應立即停藥就醫。
5. 若發生急性且快速惡化的呼吸困難時，應立即請教醫師。
6. 為減少口腔咽喉發生念珠菌感染之機率，每次使用後應以水漱口。若口腔或喉嚨發紅或有白苔，請告知醫師。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏。
- 胸痛、胸悶、呼吸困難加劇。
- 皮膚顏色變化、容易瘀傷、肌肉無力、臉圓或浮腫。
- 眼痛或視力改變。
- 快速、劇烈或不均勻的心跳。
- 發燒、發冷、咳嗽、口咽痛、身體酸痛。
- 疲倦、虛弱、噁心、嘔吐、頭暈。
- 震顫、神經質。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

心悸、頭痛、顫抖、咽喉輕微刺激、咳嗽、嘶啞、口腔或喉嚨有瘡或白斑。