

Indacaterol+glycopyrronium 吸入劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Indacaterol/ Glycopyrronium	Ultibro Breezhaler®	昂帝博 吸入膠囊	I:110, G:50mcg/cap; 30 caps/SET

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
慢性阻塞性肺疾之維持治療。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**


已知對 Indacaterol、Glycopyrronium 或配方中的賦形劑過敏者。

- ◆ **用量與用法：**

膠囊僅可使用吸入器吸入，不可吞服。

使用步驟：

1. 拔開帽蓋。握住吸入器的底座，以傾斜掰開口含器的方式，將吸入器打開。
2. 沿著鋁箔片的分割線分開一個膠囊泡殼，撕開背面的保護膜，露出膠囊。
(不要將膠囊壓出鋁箔。膠囊應存放在鋁箔片中，要使用前才取出)
3. 將膠囊放入膠囊室中，蓋好吸入器。
4. 直立握住吸入器，口含器朝上。同時緊壓兩邊的按鈕來刺破膠囊。
(只可刺破膠囊一次)
5. 將氣完全吐出。(不要對著吸入器吐氣)
6. 緊閉雙唇含住口含器。快速但穩定吸氣，儘可能深深吸氣。(不要壓兩側按鈕)
7. 吸藥以後，將吸入器由口中移出後，閉氣至少 5 至 10 秒。
8. 打開吸入器檢視膠囊中是否仍有粉末殘留。
9. 若膠囊中仍有粉末：關上吸入器，重覆步驟 5 至 7。
10. 在吸完昂帝博吸入膠囊一日劑量後：將空膠囊由膠囊室中倒出，並丟棄空膠囊。不可將膠囊存放在吸入器中。



吸入器清潔：

1. 以乾淨、乾燥的無塵布擦拭口含器內外，以去除任何的粉末殘留物。
2. 保持吸入器乾燥。切勿用水清洗吸入器。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 將昂帝博吸入膠囊存放在 30°C 以下，應存放在鋁箔片中以防潮，只有在使用前才取用。
2. 每次新的處方均有附加一個吸入器，吸入器使用 30 天後應丟棄。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

- ◆ **忘記用藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，不可一次服用兩倍劑量。

- ◆ **注意事項：**

1. 昂帝博不可用來治療氣喘，不可用於氣管痙攣急性症狀發生時的治療，亦不得用以緩解急性症狀。

Indacaterol+glycopyrronium 吸入劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Indacaterol/ Glycopyrronium	Ultibro Breezhaler®	昂帝博 吸入膠囊	I:110, G:50mcg/cap; 30 caps/SET

- 在您使用吸入器吸藥時，膠囊會在膠囊室中旋轉，您會聽見呼呼的聲音。在藥品進入您肺臟時，您會覺得有甜味。如果沒有聽見呼呼的聲音：打開吸入器並小心輕拍底座來使膠囊鬆動。不可以壓到兩邊的按鈕。
- 使用本藥前，若有下列事項請先告知醫師：懷孕或準備懷孕、哺乳、腎臟疾病、青光眼、攝護腺肥大、膀胱障礙、排尿困難或同時服用其他藥物。
- 眼睛疼痛或眼睛不舒服、視力模糊、視覺有光暈或彩色影像，有這些症狀請立即請教醫師。
- 若發生急性且快速惡化的呼吸困難時，應立即請教醫師。
- 使用昂帝博吸入膠囊後不需要漱口。

◆ 可能引起的副作用和發生時得處理方法：

服用藥後副作用不常發生，但偶爾有

症狀	處理方法
<ul style="list-style-type: none"> - 過敏反應(搔癢、蕁麻疹、面部或手部腫脹、口腔或咽喉腫脹或刺痛、胸悶或呼吸困難) - 眼睛疼痛或眼睛不舒服、視力模糊、視覺有光暈或彩色影像 - 心律不整、心跳過速 	請停藥，並立即就醫
頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、咳嗽、震顫、視力調節障礙、口乾	症狀嚴重或持續時，請告知醫師
舌頭上有小塊膠囊	此狀況不會對您造成傷害，若膠囊被刺破不只一次，則膠囊碎成小塊的可能性會增加