

Kaolin-pectin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Kaolin-pectin susp	Pecolin [®] susp	高克痢懸浮液	120毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

暫時緩解輕微或中度急性腹瀉。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
2. 腹瀉後使用，每次間隔至少4小時，1日不宜超過4次。
3. 本藥為懸浮液劑，使用前須振搖均勻。
4. 本藥與其他藥物至少間隔3小時服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本品任一成分過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 室溫下(30°C)，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 對於牛奶或乳製品耐受度低者請小心服用。
2. 腹瀉最重要的治療是水份與電解質的補充，止瀉劑只能做為輔助性治療。不嚴重的腹瀉，不吃藥也可能自行痊癒。
3. 急性腹瀉不宜使用超過48小時。
4. 12歲以下小孩或有發燒及全身症狀者、最近使用過抗生素者、有潰瘍性結腸炎或類似疾患者，應先經醫師診治後使用，不宜自行服用。
5. 血便或黑便的病人請勿使用。
6. 便中有黏稠液體，應先經醫師診治後使用。
7. 服藥後若病情加重或腹瀉超過2天，請立即停藥並就醫。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

皮膚紅疹、搔癢、蕁麻疹、哮喘、呼吸困難。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

口乾、腹痛、胃痛、腹脹、便秘、嗜睡、眩暈、疲勞、噁心、嘔吐。