

## Acyclovir 眼用製劑衛教單張

商品名	中文名
Devirus® oph oint	力克眼用軟膏

◆ **組成：**

每公克眼藥膏含抗病毒劑 acyclovir 30 毫克，每條軟膏含 4.5 克。

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）  
純庖疹性角膜炎。

◆ **不可使用本藥之情形(禁忌症)：**

對本藥之任一成份過敏者。

◆ **使用方式：**

1. 使用前請先將手洗乾淨。
2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
3. 一手手指置眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩
4. 另一手將眼藥膏約擠出一公分長置於眼窩穹窿內。
5. 閉上眼睛前請先往下看，將眼睛閉起 1~2 分鐘使藥品吸收。
6. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥膏或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
7. 若眼藥水併用眼藥膏時，請先點眼藥水間隔至少為 10 分鐘後再點眼藥膏。

◆ **注意事項：**

1. 點藥前需取出隱型眼鏡，點藥後除非醫師有特別指示，需隔 30 分鐘以上再戴上。
2. 少數病人使用後出現短暫之輕微刺痛。若症狀持續且嚴重請回診告知醫師。
3. 應依照醫師指示按時使用，不可自行停藥。
4. 眼睛受傷，眼球感染或需要進行眼科手術，請告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
嚴重過敏
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
眼部刺激刺痛，瞼炎，結膜炎

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存於室溫 25°C 以下陰涼處，避免陽光直射。
2. 未開封藥膏可保存至瓶身標示有效期限。
3. 已開封藥膏最多只能存放一個月，逾時請丟棄

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/6/2 修訂】

BTC00EV01-02