

Antazoline/Tetrahydrozoline 眼用製劑衛教單張

商品名	中文名	規格
Alminto Eye Drop	安敏易眼藥水	10 毫升/瓶

◆ **組成：**

- 1 每毫升含抗組織胺 Antazoline 0.15 毫克與擬交感神經作用劑 Tetrahydrozoline 0.5 毫克。
- 2 Antazoline 可解除眼睛過敏症狀，因其具有抗黏膜充血作用，故能解除眼睛的紅絲。
- 3 Tetrahydrozoline 有微血管收縮作用，能解除眼睛紅腫。

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

眼睛疲勞、刺激性過敏、眼睛過敏、結膜炎、結膜充血。

◆ **用量與用法**

請遵循醫師指示服用，切勿自行更改頻次、使用天數。

◆ **不可使用本藥之情形(禁忌症)：**

- 1 對本藥任一成份過敏者。
- 2 狹角性青光眼、乾眼患者。
- 3 2 歲以下幼童。

◆ **使用方式：**

1. 使用前請先將手洗淨擦乾。
2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。
4. 以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將眼藥水點在眼窩穹窿內。
5. 一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染。
6. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。
7. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
8. 若需點兩種以上眼藥水時，請相隔 5 分鐘以上再重複上述步驟點第二種眼藥水。

◆ **藥品儲存：**

- 1 室溫 25°C 以下陰涼處，避光、避濕及避熱。
- 2 開瓶後最多只能存放一個月，逾時請丟棄。
- 3 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

- 1 點藥前需取出隱形眼鏡，點藥後需間隔至少 15 分鐘才可再把隱形眼鏡戴上。如果眼睛發炎或感染，請勿配戴隱形眼鏡。
- 2 此藥可能會暫時性的減少淚液分泌，造成戴隱形眼鏡時的不適感。
- 3 點藥後可能會有短暫的視力模糊，開車或做其他需要有清楚視力的工作時，要小心使用。
- 4 嚴重心血管疾病、內分泌異常、青光眼或乾眼症患者、使用升壓藥或單胺氧化酶抑制劑，請先告知醫師。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/6/4 修訂】

BTC00EV02-02

Antazoline/Tetrahydrozoline 眼用製劑衛教單張

商品名	中文名	規格
Alminto Eye Drop	安敏易眼藥水	10 毫升/瓶

5 使用後可能會有眼內壓變化、瞳孔擴張、灼熱感、刺痛感、流眼淚等副作用發生，若症狀持續且嚴重，請回診告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏。
- 高血壓的徵候例如嚴重頭痛或頭暈、昏倒或視力改變。
- 心臟病徵象，如胸痛、心動過速、感覺異常的心跳或呼吸短促

2 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

眼睛疼痛或眼睛刺激；結膜充血、乾燥及灼熱感；視力模糊、瞳孔放大。