

## Cyclosporine 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Cyclosporine	Restasis®	麗眼達眼用乳劑 0.05%	0.05%/0.4ml/vial

- ◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
治療嚴重乾性角結膜炎併角結膜上皮病變患者之發炎反應，但在目前使用局部抗發炎藥物或使用淚點塞病患未見療效者。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 使用前，將單位劑量小瓶上下顛倒數次，形成均勻白色不透明乳液後，於雙眼各滴一滴。
3. 每日 2 次，1 次 1 滴，2 次間隔約 12 小時。
4. 若同時使用人工淚液，兩種藥物應間隔 15 分鐘。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

對本藥或其賦形劑成分過敏者或目前有眼部感染者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快用藥；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，千萬不可使用兩倍劑量。

◆ **注意事項：**

1. 單位劑量小瓶限單次使用，開封後應立即使用，剩餘藥劑應丟棄。
2. 禁止於配戴隱形眼鏡狀態下投藥，若有配戴隱形眼鏡請先取下，等麗眼達眼用乳劑投藥後 15 分鐘，再重新戴上隱形眼鏡。
3. 點藥時請注意勿讓瓶口尖端碰觸到眼睛、眼瞼或其他部位皮膚，以免造成藥物汙染或眼睛表淺損傷。
4. 點藥後可能會造成視力模糊，駕車或做其他需要有清楚視力的工作時請小心。
5. 懷孕或準備懷孕、眼部感染，請先告知醫師。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

服用藥後副作用不常發生，但偶爾有

症狀	處理方法
過敏反應(搔癢、蕁麻疹、面部或手部腫脹、舌頭腫脹或咽喉水腫或刺痛、胸悶或呼吸困難)	請停藥，並立即就醫
視力模糊、感覺眼睛有異物、眼睛有灼熱感、眼睛發癢發紅、分泌物增加、溢淚、眼痛。	症狀嚴重或持續時，請告知醫師

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 15-25°C 下陰涼處，避免陽光直射。
2. 單次使用小瓶應置於原鋁箔包裝內避光儲存，要用前再取出。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。