

Betamethasone disodium phosphate 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Betamethasone disodium phosphate	Fusone®	富適點眼液	0.5 毫克/0.5 毫升/單支

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、虹彩炎等之炎症性眼科疾患、手術後炎症。
- ◆ **用量與用法：**
請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **使用方式：**
 1. 使用前請先將手洗淨擦乾。
 2. 旋轉單次使用小瓶上蓋以開啟，頭部往後仰或平躺。
 3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。用另一隻手將小瓶靠近您的眼睛。輕輕擠壓瓶身，使 1 滴進入下眼瞼和眼球之間的眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意小瓶瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防受到污染。
 4. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。
 5. 用畢。扔掉任何未使用的藥物。(不含防腐劑，開啟後藥物不會保持無菌狀態。)
 6. 若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
 7. 若需點兩種以上眼藥水時，請相隔 5 分鐘以上再重複上述步驟點第二種眼藥水。眼用藥膏至少間隔十分鐘以上。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
對此成分過敏之患者。
- ◆ **藥品儲存：**
儲存於室溫 25°C 以下，避免陽光直射。
- ◆ **注意事項：**
 1. 本藥不含防腐劑，開封後應立即使用，剩餘藥液應丟棄。
 2. 單次使用容器瓶嘴不要接觸到睫毛、眼睛、眼瞼，以防受到污染或受傷。
 3. 因本品含類固醇，長期使用會增加青光眼、白內障風險。使用數週後應定期做眼內壓檢查。
 4. 孕婦或可能已懷孕之婦人應避免長期頻繁使用。
 5. 未滿 2 歲之嬰幼兒應慎重使用。
 6. 患有青光眼、白內障、糖尿病、眼睛感染等疾病病史，請先告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
嚴重過敏；視力減退；嚴重眼睛痛、刺激、化膿、感染。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
眼壓升高、白內障、局部刺激不適。