

## Nystatin vag.外用栓劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格/劑型
Nystatin	Statin <sup>®</sup> vaginal tab	速淨陰道錠	100,000 單位/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
局部性陰道念珠菌感染。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 最好在睡前使用。
3. 若栓劑不易推入，可將栓劑迅速放入溫水濕潤。

**使用方式：**

↓ 雙手洗淨擦乾。

↓ 仰臥並將雙腿彎曲，撕開外包裝取出藥錠，用手指推入陰道深處(約兩個食指指節深)。

↓ 可在內褲底部墊衛生棉墊。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

對本藥或其賦形劑成分過敏者。

◆ **藥品儲存：**

1. 室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 請依醫師指示使用完整個療程，即使是症狀已改善或月經期間也不應中斷。
2. 治療時不可用刺激性肥皂清洗，且應避免性行為以避免交叉感染；若欲從事性行為，應使用保險套。
3. 使用後如有黏稠或水液狀之液體自陰道流出，屬正常現象，可在內褲底部墊衛生棉墊，勿立即進行陰道之沖洗，以免將未吸收的藥物洗掉，而影響藥效。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 發生以下症狀時，請立即就醫  
嚴重過敏(蕁麻疹、臉部四肢腫脹、舌頭或咽喉腫脹、胸悶、呼吸困難)。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
陰道灼熱感或發癢。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/7/29 修訂】

BTC00EW05-02