

Alcos-anal Ointment 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Sodium oleteate	Alcos-anal® Ointment	益痔康軟膏	100 毫克/克；20 克/條

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
肛門用軟膏，治療內外痔並緩解痔瘡所引起的疼痛及搔癢等症狀。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請依醫師指示使用，可塗敷於肛門內、外。
 2. 外痔：以溫水洗淨肛門，以軟紙拭乾，再塗佈益痔康軟膏。於夜晚使用時，在塗佈藥膏後，如能覆以軟布，則效力更佳。
 3. 內痔：軟膏管上套以使用器，為使插入肛門便利，宜先塗些軟膏於使用器上，再行儘量插入肛門，輕壓軟膏管，同時緩慢拉出使用器，使軟膏均勻塗布於內痔患處，將使用器清潔後備下次使用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
對本藥所含成分過敏者。
- ◆ **忘記用藥時該如何處理？**
想起來的時候，儘快補用。但若已接近下次用藥時間時，則不要補用，只使用一次劑量即可。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕(勿置於浴室)及避熱。使用後應拆下使用器並旋緊蓋子。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 本藥僅限肛門及其周遭黏膜皮膚使用，勿施用與身體其它部位。
 2. 使用本藥通常在短時間內疼痛即可消失，流血亦可停止。初用藥時常有灼熱感覺，此種現象在用藥兩三日後即消失。
 3. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及良好的排便習慣來控制痔瘡。便秘及堅硬之大便對痔瘡之治療常有很大的妨害，患者應養成每日大便的習慣，並保持大便的暢通。
 4. 注意保持肛門之清潔，並使用軟質衛生紙。
 5. 症狀消失後可能仍需繼續用藥數星期，請遵照醫師指示使用。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
嚴重過敏。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
疼痛、出血、搔癢。