

Salicylic acid/Lactic acid 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Salicylic acid 16.7% Lactic acid 16.7%	Duofilm®	治疣液	15 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 是一種角質溶解劑，可除去被感染之上皮細胞，而用於疣之治療。

◆ **用量與用法：**

每天一次，使用所附的刷子滴 2~4 滴於疣、雞眼上。

請勿使用超過 12 週，若 12 週後疣未消失請回診。

使用方法：

↓ 用熱水浸泡疣、雞眼之部位至少 5 分鐘，並用浮石或銼刀輕輕磨去多餘的角質。

↓ 用乾毛巾擦乾。

↓ 使用所附的刷子滴 2~4 滴於疣、雞眼上。在滴第 2 滴以前必須等前 1 滴乾了才能在滴。

↓ 擦過藥後，可用 OK 繃或透氣膠帶覆蓋於疣的表面。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本製劑成分有過敏史者。

2. 除非有醫師指示，糖尿病及有血液循環障礙之病人不宜使用。

3. 勿使用於開放性傷口、刺激不適或發紅的皮膚。

4. 勿使用於黑痣、胎記、長毛的疣、生殖器疣、臉部或黏膜部位(如眼、口、鼻)的疣。

◆ **藥品儲存：**

1. 為易燃品，請栓緊瓶蓋，並遠離火源、熱源，於室溫 25°C 以下陰涼處貯存。

2. 避免放在孩童可以取得的場所。

◆ **注意事項：**

1. 藥液易燃，請勿在明火處附近或抽菸時使用。

2. 使用中，倘若刺激性太強時，可暫停使用，待數天後無刺激感後再使用。若皮膚出現過度刺激應停止治療。

3. 取適量的藥水，避免過多的藥液流到正常皮膚。若不慎觸及眼睛或黏膜，應儘速用清水沖洗 15 鐘。

4. 外用水楊酸同口服水楊酸有引起雷氏症候群(Reye's syndrome)的風險，不宜用於罹患水痘、流感或其他病毒感染或剛痊癒之兒童或 10 多歲之青少年。

5. 使用過於頻繁、長時間使用、或使用於大面積(超過 5 平方公分)，身體會吸收太多水楊酸而有中毒風險，若出現中毒症狀(口渴、耳鳴或聽力受損、極度疲倦或無力、呼吸急促、眩暈、不正常的手腳灼熱感)，請立即停藥就醫。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

嚴重過敏；耳鳴或聽力受損、極度疲倦或無力、呼吸急促、眩暈、不正常的手腳灼熱感。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

局部刺激、乾燥、灼熱感、發紅、搔癢、刺痛感。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/07/30 修訂】

BTC00EW14-02