

Sertaconazole 外用凝膠衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Sertaconazole nitrate	Zalain 2% gel	達來外用凝膠 2%	20mg/g, 30ml(g)/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療頭皮之脂漏性皮膚炎，及因黴菌感染所引起之頭皮屑。
- ◆ **用量與用法：**
請依醫師指示使用，通常一週使用 2 次，連續使用 2~4 週。
使用方法：
 1. 在頭皮或頭髮上塗抹適量本品，並做頭皮按摩，勿用指甲搔抓頭皮。
 2. 讓凝膠停留在頭皮 3~5 分鐘後以清水沖洗乾淨。
 3. 勿使用過熱的水沖洗頭皮。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 已知對本品或對其中任何一項賦型劑有過敏現象時，請勿使用本品。
 2. 曾對 Imidazole 類藥品產生過敏反應之病患需謹慎使用。
- ◆ **忘記用藥時該如何處理？**
一旦想起應儘快補上錯過的藥劑。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。切勿一次塗抹兩倍或額外劑量，以免過量可能發生危險。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：保存於 30°C 以下陰涼乾燥處，避免陽光直射。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 若連續使用 4 週後仍不見改善，請回診重新診察病因。
 2. 如先前使用過皮脂類固醇治療脂漏性皮膚炎，請停藥兩周後再開始使用本品，以避免產生皮膚刺激情形。
 3. 本品不適用於治療嬰兒脂漏性皮膚炎。
 4. 本品需避開眼、口腔、陰道黏膜等部位。
 5. 使用本品前幾天，可能輕微出現紅斑反應，但是無需停藥。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏；使用部位出現水泡、灼痛、瘙癢、滲液、泛紅、腫脹、皮膚脆弱或其他刺激。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
紅斑。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/08/03 修訂】

BTC00EW19-02