

Estradiol hemihydrate 外用凝膠衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Estradiol hemihydrate	Divigel®	迪維舒凝膠	0.1 %, 1 克凝膠/包

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
女性由於自然停經或手術後引起之女性荷爾蒙缺乏症。
- ◆ **用量與用法：**
請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
塗抹部位：
 - ✓ 塗抹於下軀幹表皮或交替塗在左右大腿內側。
 - ✗ 避免塗抹陰部、乳房、眼睛、臉和黏膜等部位。
- 使用步驟：**
 1. 使用藥品前先把手洗乾淨。
 2. 藥品打開後將內容物擠到手掌心。
 3. 使用時將凝膠塗在下軀幹表皮或交替塗在左右大腿內側。其塗抹面積約為手掌之 1-2 倍。
 4. 塗抹之後應等待數分鐘讓凝膠變乾，一小時內不宜以清水沖洗。
 5. 凝膠應避免意外接觸到眼睛，塗抹後應即刻洗手。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 不明原因之陰道出血。
 2. 嚴重肝疾病患者。
 3. 對此藥品成分過敏者。
 4. 孕婦禁用本品。
 5. 過去兩年曾有靜脈栓塞、復發性靜脈血栓病史或有血栓疾病而尚未接受抗凝血藥物治療者。
 6. 已知或懷疑之惡性腫瘤，特別是乳癌/或子宮內膜癌。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快使用；若已超過 12 小時、接近下次使用藥品時間，按時使用下次劑量即可。
 2. 忘記塗抹可能會導致陰道出血(經血)的情形。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下乾燥處，避免陽光直接照射。本品含酒精，請避開火源。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 如果懷孕或計畫懷孕、哺乳，請告訴您的醫師。
 2. 應告知醫師是否有其它疾病或相關病史，包括：乳癌、子宮內膜癌、靜脈栓塞、嚴重肝疾病。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 胸痛或胸悶；咳血；呼吸短促、單腿或單臂腫脹、發熱、麻木、膚色改變或疼痛。
 - 尿色深、疲倦、胃部不適或胃痛、糞便顏色變淺、嘔吐、皮膚或眼睛泛黃。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
皮膚刺激、乳房漲痛、噁心、嘔吐、胃痙攣、水腫、體重增加、頭痛、不規則之陰道出血或點狀出血。