

Tadalafil 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tadalafil	Cialis®	犀利士膜衣錠	5 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療勃起功能障礙。
2. 良性攝護腺(前列腺)肥大症所伴隨的下泌尿道症狀。

◆ **用量與用法：**

請遵循醫師指示服用。通常每日一次於固定時間服用，與性行為發生時間無關。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對 tadalafil 或此藥的任何賦形劑過敏。
2. 勿同時服用 nitrates 類藥物，如 nitroglycerin(耐絞寧錠)、Isosorbide dinitrate (易適倍錠)、Isosorbide-5-mononitrate(寬心持續性藥效錠)。
3. 90 天內有心肌梗塞、紐約心臟協會分級第二級以上之心臟衰竭、不穩定心絞痛或曾在性交時發生心絞痛者、6 個月內曾中風、未受控制之心律不整或高血壓、低血壓(<90/50mmHg)。
4. 非動脈性前部缺血性視神經病變(NAION)而一眼失明之病人。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥品不適用於女性及孩童。
2. 治療勃起功能障礙時，本藥作用之產生，性刺激是必須的。
3. 若勃起時間過長或疼痛性勃起超過 4 小時，應立即尋求醫療協助。
4. 服用本藥不可過度飲酒，以免造成血壓過低，尤其是與其他降低血壓的藥物一起服用時。
5. 請勿同時服用硝酸鹽藥物。服用犀利士後至少 48 小時，才可以使用硝酸鹽藥物，如 nitroglycerin(耐絞寧錠)、Isosorbide dinitrate (易適倍錠)、Isosorbide-5-mononitrate(寬心持續性藥效錠)。
6. 請勿同時服用其他含有與犀利士同成份(tadalafil)或與其類似的藥物，包括 sildenafil (Viagra 威而鋼)或 vardenafil (Levitra 樂威壯)。
7. 有使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)，特別是心血管疾病用藥、抗黴菌藥(ketoconazole)，請先告知醫師。
8. 若需要併服其他藥品，例如降壓藥、治療前列腺肥大的藥物等，請先告知您的醫師您有服用此藥。
9. 犀利士含有乳糖。有罕見遺傳性半乳糖不耐症，Lapp 乳糖酶缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收異常不應使用此藥品

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/08/06 修訂】

BTC00EZ06-02

Tadalafil 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tadalafil	Cialis®	犀利士膜衣錠	5 毫克/錠

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

嚴重過敏、胸痛、呼吸困難、突然或嚴重頭痛；陰莖勃起持續超過 4 小時；視力減弱或喪失、藍光幻視、閃光幻視；聽力突然下降或聽力喪失、耳鳴、頭暈。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、臉部、頸部、手臂或上胸部發燙或發紅；背部或肌肉疼痛；鼻塞或流鼻涕；胃部不適、消化不良、噁心。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/08/06 修訂】

BTC00EZ06-02