

Isosorbide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Isosorbide-5-mononitrate	Ibimo [®]	愛彼脈持續性藥效膜衣錠	60 毫克/錠
Isosorbide dinitrate	Isobide [®]	易適倍錠	10 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 預防狹心症之發作或緩解胸痛。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 愛彼脈持續性藥效膜衣錠：請直接和水吞服，可以剝半服用，但請勿嚼碎或磨粉。

3. 易適倍錠：因食物會影響吸收而降低藥效，易適倍錠最好空腹服用。

4. 若有血管性頭痛的副作用發生且無法有效地控制，則可以和食物同時服用，以減輕此副作用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品任一成分過敏者。

2. 不可與壯陽藥威而鋼 (Viagra[®])、威而壯 (Levitra[®])、犀利士 (Cialis[®]) 併用。

3. 不可與肺動脈高壓的治療藥愛定保肺膜衣錠(Adempas[®])併用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 易適倍錠儲存於室溫 15-30°C 下，愛彼脈持續性藥效膜衣錠室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥不可和酒精併用，可能會影響藥效，增加發生低血壓的危險。

2. 服用本藥後可能會發生頭昏、暈眩。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。快速的變換姿勢，從臥姿或坐姿起立，可能會發生姿勢性低血壓，若要起立請放慢動作緩慢的起身。

3. 服藥後可能會發生頭痛，此為藥效發揮的徵兆之一，請勿因此而停藥或減少服藥量，若頭痛劇烈無法忍受，請回診告知醫師。

4. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳、請告知您的醫師。告知醫師您最近是否有心臟病發作、心力衰竭、心臟增大、血壓低或其他心臟病。

5. 有使用任何其他藥物 (包括非處方藥，維生素和草藥產品)，例如其他類降血壓藥物，請先告知醫師。

6. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。

7. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/9/7 修訂】

BTC00EF26-02

Isosorbide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Isosorbide-5-mononitrate	Ibimo®	愛彼脈持續性藥效膜衣錠	60 毫克/錠
Isosorbide dinitrate	Isobide®	易適倍錠	10 毫克/錠

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

過敏、嚴重或持續頭暈、頭暈或暈厥、嚴重頭痛、心跳緩慢、胸痛加劇。

虛弱、心跳快速：可馬上躺下、蹲下或坐下，若症狀未改善或昏倒，請立即就醫。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

輕度頭痛。