

Fluconazole 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Fluconazole	Diflucan®	泰復肯膠囊	50 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
念珠菌局部或全身感染、囊球菌感染、預防後天免疫缺乏症候群病人的黴菌感染。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 即使您開始感覺好轉，也要在整個治療期間使用該藥。如果您過早停止使用該藥，您的感染可能會復發。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

Fluconazole 不應用於已知對此藥、任何賦形劑成分或相關 azole 類化合物過敏的病人。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 懷孕時應避免使用，治療之益處大於對胎兒可能的風險時，方可使用。施用單次劑量 150 mg fluconazole 後可能可以繼續哺餵母乳。接受重複劑量或高劑量 fluconazole 後，則不建議哺餵母乳。
 2. 本藥會降低避孕藥效果請改其它方式避孕，避孕措施應執行至最後一次服藥後約 1 週。
 3. 服藥後，可能發生頭暈副作用，若有駕駛或操作機械時須小心。
 4. 肝、腎功能不全或有潛在性前心律不整之病人，請先告知醫師。
 5. 本藥會影響肝臟代謝的酵素，易有藥物交互作用，有使用任何藥物，包含處方藥或非處方藥，請先告知醫師。
 6. 本藥品成分含有乳糖，不建議用於有半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良的病人。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 蕁麻疹、臉手部水腫、喉嚨腫脹、吞嚥困難、呼吸困難、皮疹、紅斑、水泡、黏膜潰瘍。
 - 腸胃不適、噁心嘔吐、眼睛或皮膚變黃、茶色尿、糞便顏色變淺、伴隨異常疲累。
 - 心悸、心跳過快、過慢或不規則、心律不整。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、頭痛。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/8/19 修訂】

BTC00EB09-02