

**Famciclovir 口服製劑衛教單張**

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Famciclovir	Famvir®	抗濾兒膜衣錠	250 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡) 治療帶狀疱疹及生殖器疱疹。
- ◆ **用量與用法：**
  1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
  2. 即使您開始感覺好轉，也要在整個治療期間使用該藥。如果您過早停止使用該藥，您的感染可能會復發。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 已知對 famciclovir、penciclovir 或其他組成 (例如：乳糖) 過敏者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
  2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
  1. 若用於生殖器疱疹，服用本藥品並無法預防疾病傳染，應避免性行為或採用「安全性行為」的作法。
  2. 服藥後可能會感覺頭暈、想睡、精神混亂，在您了解服藥後的反應前應避免開車或操作機械等需專注力的行為。
  3. 肝、腎功能不全、懷孕及哺乳婦女，請先告知醫師。
  4. 本藥含有乳糖，故有乳糖不耐症、嚴重乳糖酶缺乏、葡萄糖-半乳糖吸收不良，應小心使用。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
  1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
    - 蕁麻疹、臉手部水腫、喉嚨腫脹、吞嚥困難、呼吸困難。
    - 腸胃不適、噁心嘔吐、眼睛或皮膚變黃、茶色尿、糞便顏色變淺、伴隨異常疲累。
  2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、頭暈目眩、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、潮紅、搔癢、肝功能檢查異常。