

Isoniazid 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Isoniazid	Isoniazide®	異菸鹼醯胍錠	100 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療肺結核、其他結核症。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 請於空腹時服用，飯前至少 1 小時前，飯後至少 2 小時後服用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對此藥成分過敏。
 2. 急性肝病或曾經使用過改藥導致肝臟受損者應避免使用。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服藥期間禁止飲酒。
 2. 服藥期間應避免食用富含酪胺酸的食物(發酵或醃漬的加工品)，如乳酪(起司)、優格、香腸、培根、啤酒、紅酒、味噌等，可能會引起高血壓、頭痛、潮紅、心悸、發汗、頭昏、寒顫、腹瀉等擬交感神經作用。若發生上述症狀，請立即就醫。
 3. 本藥可能會引起周邊神經炎，可補充維他命 B6。若發生手、腳手腳刺痛或麻木感，請告知醫師。
 4. 本藥可能會引起肝功能異常，請定期回診檢查，若發生食慾降低、胃腸不適、疲倦、皮膚或眼睛變黃，請立即就醫。
 5. 有使用任何處方藥或非處方藥，請先告知醫師，特別是抗癲癇藥、抗黴菌藥、避孕藥、免疫抑制劑。
 6. 若您懷孕、計畫懷孕或哺乳、有肝、腎臟損傷、心臟病、癲癇病史，請先告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 過敏皮疹。
 - 肝功能異常：食慾降低、胃腸不適、噁心嘔吐、疲倦、茶色尿、皮膚或眼睛變黃。
 - 周邊神經炎：手腳刺痛或麻木感。
 - 中樞神經異常：感到混亂、記憶不佳、視力改變。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
腹瀉、腹痛。