

Itraconazole 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Itraconazole	Sporanox®	適撲諾膠囊	100 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡) 治療全身性或深部黴菌感染、甲癬、髮癬。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 應於飯後立即服用以達最佳吸收效果。
 3. 胃內酸度降低會降低本藥吸收，若需服用降低胃酸藥品，如制酸劑、質子幫浦抑制劑，應於服用 itraconazole 前至少 1 小時或服用 itraconazole 後至少 2 個小時才可使用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 孕婦及授乳婦女禁用。
 2. 對此成分過敏者禁用。
 3. 不宜用於心室功能異常的病人，如鬱血性心衰竭者。
 4. 不建議同時使用以下藥物：降血脂藥(如 lovastatin 及 simvastatin)、抗黴菌藥(如 terfenadine)、鎮靜安眠藥(如 Triazolam 及 midazolam)、麥角類藥品、促腸胃蠕動劑(如 cisapride)。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 本藥可能引起頭暈或視力模糊，若預期要開車、從事具危險性的活動、或操作機械時應小心。
 2. 育齡婦女服用本藥時應避孕，建議應持續避孕至治療結束後之經期。
 3. 本藥罕見地會發生肝功能異常，如有肝炎的疑似徵象及症狀，如厭食、噁心、嘔吐、疲倦、腹部疼痛或尿液顏色變深、糞便變白、皮膚或眼睛變黃，請立即停藥就醫。
 4. 本藥品會與部分藥品產生交互作用，若有使用任何處方藥或非處方藥，請務必告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏：皮膚起疹或起水泡、黏膜潰瘍、蕁麻疹、四肢或臉部腫脹、喉嚨腫脹、發聲或吞嚥困難、呼吸困難。
 - 肝功能異常：厭食、噁心、嘔吐、疲倦、腹部疼痛或尿液顏色變深、糞便變白、皮膚或眼睛變黃。
 - 心跳變快、變慢或不規則、心律不整、水腫、體重快速增加、胸痛、喘、呼吸困難。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/8/23 修訂】

Itraconazole 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Itraconazole	Sporanox®	適撲諾膠囊	100 毫克/錠

- 神經病變：手腳麻木、刺痛或灼熱感、味覺障礙、感覺遲鈍、皮膚感覺異常。
- 聽力受損或聽力喪失。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭暈、頭痛、鼻炎、噁心、腹痛、腹瀉、耳鳴、視力模糊。



藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/8/23 修訂】