

Amoxicillin / Clavulanic acid 口服製劑衛教單張

	商品名	中文名	含量/劑型
Amoxicillin + Clavulanic acid	Curam®	諾快寧膜衣錠	A 875 毫克+ C 125 毫克 /錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 錠劑應整顆吞服，不可咀嚼，如有需要可將錠劑剝半以利吞服。
 2. 若服藥容易胃腸不適，建議隨餐服用。
 3. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 曾對盤尼西林(Penicillin)及頭孢子菌素(Cephalosporin)類藥品過敏者。
 2. 曾有過與本藥或 Penicillin 有關的黃疸/肝功能異常的病史。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：應儲存在未開封之原始包裝中；室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 治療期間若無醫師指示，請勿自行停藥，即使症狀已好轉，也應繼續服藥直到整個療程結束，以避免抗藥性產生。
 2. 服用本藥，可能會有輕微腹瀉情形發生，若嚴重且持續甚至出血性腹瀉，請告知醫師。未經醫師指示，切勿自行服用止瀉藥。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 過敏反應(如臉、唇、喉嚨腫脹、皮膚搔癢、紅疹、蕁麻疹、呼吸困難、原因不明發燒等)。
 - 嚴重腹瀉並伴有血便、胃痙攣甚至發燒。
 - 皮膚起水泡、脫皮。
 - 小便量或頻率改變。
 - 肝功能變化(食慾減退、噁心、嘔吐、腸胃不適、疲倦、尿液顏色變深或大便顏色變淺、眼睛或皮膚發黃)。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
腹瀉、噁心、嘔吐。