

Clindamycin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Clindamycin	Lindacin®	利達信黴素膠囊	150 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌等所引起之感染症。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 建議配一整杯開水吞服，避免膠囊黏著於食道造成刺激。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 曾對本藥或 Lincomycin 過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 15~30°C，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 治療期間若無醫師指示，請勿自行停藥，即使症狀已好轉，也應繼續服藥直到整個療程結束，以避免抗藥性產生。

2. 如有結腸炎病史，請先告知醫師。

3. 若有嚴重、持續性或出血性腹瀉，請務必告知醫師。未經醫師指示，切勿自行服用止瀉藥。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 過敏反應：臉、唇、喉嚨腫脹、皮膚搔癢、紅疹、蕁麻疹、呼吸困難、原因不明發燒等。

- 嚴重腹瀉並伴有血便、胃痙攣甚至發燒。

- 肝功能異常：食慾減退、噁心、嘔吐、腸胃不適、尿液顏色變深、皮膚或眼睛變黃。

- 異常出血、瘀傷或虛弱。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、食道炎、肛門或生殖器周圍搔癢。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/8/23 修訂】

BTC00EC11-02