

## Pyridostigmine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Pyridostigmine	Antilon®	肌立健膜衣錠	60 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療重症肌無力。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 建議與食物併服以減少消化道刺激之副作用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥成分曾過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：藥品須存放在原密閉且不透光的包裝瓶中，室溫保存，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 若正值懷孕或哺乳，或有氣喘、心臟疾病、攝護腺肥大、腸道或尿道阻塞，請先告知醫師。

2. 本藥可能引起視力模糊，因此若預期要開車、從事具危險性的活動、或操作機械時應小心。

3. 服藥期間請勿飲酒。

4. 若服藥期間肌肉無力症狀加重，可能為藥品劑量不足或過多，請告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 過敏反應(如臉、唇、喉嚨腫脹、皮膚搔癢、紅疹、蕁麻疹、呼吸困難、原因不明發燒等)。
- 心跳不規則、變慢。
- 肌肉無力情形增加。
- 意識模糊、言語不清。
- 癲癇發作。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

緊張、焦慮、肌肉抽搐、多汗、噁心、嘔吐、腹瀉、胃痙攣或胃痛、唾液/淚液分泌增加。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/10/13 修訂】

BTC00EE04-02