

Gemfibrozil 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Gemfibrozil	Lopid®	洛脂膠囊	300 毫克/膠囊

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
降低血中的膽固醇及三酸甘油酯：減少心血管疾病及中風的發生率。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
 2. 請於飯前 30 分鐘服用，以達最佳的藥效。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥過敏者
 2. 嚴重腎功能不全者。
 3. 嚴重肝功能不全及有膽囊疾病者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 20-25°C 下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥請勿與酒精併用，可能會增加藥品的副作用
 2. 服藥期間若發生不明原因的肌肉疼痛、無力，伴隨疲倦、虛弱、不明原因的發燒，請立即回診就醫。
 3. 有肝、膽、腎疾病病史、已懷孕或計畫懷孕、哺乳婦女、或甲狀腺功能低下，請先告知您的醫師。
 4. 若現在正在服用 HMG-CoA reductase inhibitors 類的降血脂藥 (如 Tulip 妥寧膜衣錠、Crestor 冠脂妥)、抗凝血藥 (Warfarin)、Sulfonylureas 類降血糖藥 (如 Gluzide 格汝唐、Amaryl 瑪爾胰) 請先告知醫師或藥師。
 5. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血脂。
 6. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
 7. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

不明原因的肌肉疼痛、無力，伴隨虛弱、不明原因的發燒。
皮膚或眼睛變黃、嚴重嘔吐、茶色尿、糞便顏色變淺。
嚴重胃痛伴隨噁心嘔吐。
蕁麻疹、皮膚紅疹。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

胃痛、脹氣、心灼熱、消化不良。