

Labetalol 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Labetalol	Labtal [®]	壓血泰膜衣錠	200 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 治療中至重度的高血壓：要長期且按時服用，才能確保療效。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥或其他同屬於乙型交感神經抑制劑(β -blockers)類的藥物過敏者。
 2. 第二、三級房室傳導障礙(AV blocker)、嚴重竇性心跳過慢未使用心律調整器(pacemaker)者。
 3. 嚴重肺部、支氣管方面的疾病，如氣喘、慢性支氣管疾病 (COPD)。
 4. 嚴重心衰竭。
 5. 懷孕婦女(懷孕 > 13 週)。
 6. 嚴重心跳徐緩。心因性休克。
 7. 其他伴有嚴重性或持續性低血壓患者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
 2. 由於本藥會影響血糖的變化，糖尿病患者服用本藥應特別注意並監測血糖值，若血糖控制不佳，請告知您的醫生。
 3. 使用任何其他藥物(包括非處方藥，維生素和草藥產品)之前，請先諮詢您的醫師或藥師。例如正在服用一些感冒等的成藥，請告知您的醫生或藥師。
 4. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳的婦女、有心臟、肝、腎疾病、呼吸道疾病如氣喘、氣管炎、肺氣腫病史者、糖尿病患者、或甲狀腺機能亢進者，請告知您的醫師。
 5. 請定期測量血壓、脈搏速率及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。
 6. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
 7. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。
 8. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
胸痛(可能與您的疾病有關，而與副作用無關)。暈眩或嚴重頭暈。緩慢、快速或不規則的心跳。腳或腳踝腫脹。異常出血或瘀傷。喘息或呼吸困難。眼睛或皮膚發黃。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/07/20 修訂】

BTC00EF27-02

Labetalol 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Labetalol	Labtal [®]	壓血泰膜衣錠	200 毫克/錠

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭暈、頭痛、喪失活力、胃痛、噁心、嘔吐、腹瀉、焦慮不安、鬱卒、性功能障礙。
手腳冰冷：注意保暖可改善之。