

Lercanidipine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lercanidipine	Zanidip [®]	利壓膜衣錠	10 毫克/錠

◆ 用途：

1. 治療高血壓：擴張血管，降低血壓，要長期且按時服用，才能確保療效。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 食物會影響本藥的吸收，請於飯前 15 分鐘服用。不可同時食用葡萄柚或葡萄柚汁。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對 Lercanidipine 或賦形劑過敏者。
2. 併有左心室流出道阻塞的病人。未治療的充血性心臟衰竭之病人。
3. 不穩定心絞痛，或近期（1 個月內）發生過心肌梗塞之病人。
4. 重度肝功能不全之病人。
5. 重度腎功能不全之病人(GFR < 30 ml/min)，包括正在接受透析的病人。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 服用本藥後可能會發生頭昏、暈眩。請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
2. 本品含乳糖，半乳糖不耐症、總乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良等應避免使用。
3. 服用本藥請注意口腔及牙齦的變化，若有異常應請教牙醫師。
4. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、有心臟、肝、腎疾病病史，請告知您的醫師。
5. 本藥的藥效可能會被其它同時服用的藥物所影響，請將您目前所有正在服用的藥物，如其他類心臟血管用藥（如 Lanoxin、Warfarin 等）、抗癲癇藥或成藥，告知您的醫師或藥師。
6. 請定期測量血壓、脈搏速率及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。
7. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
8. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。
9. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
皮膚紅疹、呼吸困難、四肢水腫、心悸及胸痛的頻率和嚴重度隨時間增加而增加。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭痛、潮紅、心悸、眩暈、心灼熱感、虛弱、噁心、嘔吐、腹瀉、肌痛。
牙齦腫脹：勤於刷牙可改善。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/7/20 修訂】

BTC00EF28-02