

## Losartan / Hydrochlorothiazid 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Losartan / Hydrochlorothiazid	Hyzaar®	好悅您膜衣錠	50/12.5 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療高血壓：要長期且按時服用，才能確保療效。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥、其他同屬於血管收縮素 II 拮抗劑類(angiotensin II antagonist)或磺胺類藥物過敏者。
2. 懷孕婦女。
3. 雙邊腎動脈狹窄症患者。
4. 無尿症患者

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 15-30°C 下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
2. 糖尿病病患服用本藥應特別注意血糖的變化，若血糖控制不理想，請告知醫師。
3. 本藥可能會導致血中的鉀離子過高，應多注意且控制含鉀鹽食物(如代鹽)的攝取，可先請教醫師或營養師。
4. 服用本藥可能會增加眼睛或皮膚對光的敏感性，容易曬傷，請注意防曬。
5. 若服藥期間發現懷孕，應立即停藥，並儘速就醫。
6. 計畫懷孕、哺乳的婦女、有糖尿病、痛風、紅斑性狼瘡、心臟、肝、腎疾病病史者，請告知您的醫師。
7. 請定期測量血壓、脈搏速率及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。
8. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
9. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。
10. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

皮膚癢或紅疹、臉部四肢水腫、舌頭或咽喉腫脹、呼吸或吞嚥困難。

皮膚或眼睛變黃、不明原因的排尿次數或排尿量改變、昏厥、嚴重曬傷。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、鼻塞、口乾、肌肉關節疼痛、抽筋、腹痛、腹瀉。