

## Imipramine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Imipramine	Tone®	靜安膜衣錠	10 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 改善憂鬱和焦慮情緒。
2. 舒緩神經痛和夜尿症狀。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 若是治療夜尿，一般是睡前服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或賦型劑過敏。
2. 與單胺氧化酶抑制劑併用，可能會導致高熱、嚴重痙攣及抽搐，二者投藥間隔至少需 14 天。
3. 心肌梗塞危急者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
2. 若服藥時間只有睡前服用時，等到第二天才想起，請跳過該次劑量，千萬不可在同一天服用兩次劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：避濕、避熱，30°C 以下。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥品用於治療憂鬱症時，須規律服藥一段時間後才能達到改善效果，請按醫師指示服藥，以確保療效。
2. 少數兒童或青少年服用此藥可能會增加自殺意念或行為，服藥期間請注意言行舉止是否有改變，若有異常，請儘速就醫。
3. 服用此藥時可能會引起疲倦感，應盡量避免駕車、操作機械或需專注力的活動。
4. 老年人比較容易發生副作用，如嗜睡、視力模糊、散瞳、尿液滯留、口乾、便秘、意識混淆、認知改變等，盡量避免使用，如必需使用請小心監測。
5. 本藥品與其它藥品同時使用可能有藥品交互作用，若正在服用其它藥品，請事先告知醫師。
6. 有青光眼、甲狀腺功能亢進、排尿困難、心血管疾病或嚴重肝、腎功能疾病，請先告知醫師。
7. 若計畫懷孕、已懷孕或哺乳婦女，請告知您的醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
蕁麻疹、癲癇、譫妄、心跳不規則。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
頭痛、心悸、口乾、便秘、排尿困難、性功能障礙、落髮。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/04/21 修訂】

BTC00EG05-02