

Lurasidone 口服製劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 含量/劑型 |
|------------|---------|------|---------|
| Lurasidone | Latuda® | 樂途達錠 | 40 毫克/錠 |

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療成人和青少年(13 至 17 歲)的思覺失調症。
2. 第一型雙極性疾患之鬱症發作。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 本藥請整粒吞服，請勿磨粉。
3. 與食物一起服用，可增加藥物的吸收。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品任一成分過敏。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服藥後，開車、操作機械或需要集中注意力的工作時應小心。
2. 服用本藥請避免食用葡萄柚(汁)或酒精性飲料。
3. 初次服用樂途達錠，起身站立或變換姿勢時可能出現短暫性眩暈，應放慢動作。
4. 服用抗鬱劑會有自殺的意念與行為風險，和躁症和輕躁症風險。建議監測是否惡化和出現自殺的意念或行為、躁症和輕躁症症狀、易怒、激動或不尋常的行為改變化。
5. 服藥期間應注意血糖過高和糖尿病(如：多飲、多尿、多食與無力)症狀。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

發燒、鼻咽炎、感冒、泌尿道感染等感染症狀。

錐體外症狀(動作遲緩、運動功能減退、肌肉僵直、顫抖症、帕金森氏症)、癲癇。

抗精神病藥物惡性症候群：高熱、肌僵直、精神狀態改變和自主神經不穩定(不規則的脈搏或血壓，心搏過速，出汗及心律不整)。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭暈、失眠、噁心、腹瀉、嘔吐、焦慮、焦躁不安、嗜睡。

女性停經或乳溢，男性勃起功能障礙或男性女乳症

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/06/11 修訂】

BTC00EG10-02