

Memantine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Memantine HCl	Manotin [®]	減擾膜衣錠 [®]	10 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療中重度及重度阿茲海默症。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 空腹或隨餐服用皆可。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品任一成分過敏者

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 可能會有暈眩及混亂等情形，不建議於服藥期間開車或操作機械。

2. 懷孕、準備懷孕、哺乳、肝、腎、膀胱、排尿困難，癲癇或癲癇發作等疾病病史，請告知醫師。

3. 服用本藥請定期回診追蹤，以作為藥物調整依據。

4. 使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前請諮詢醫師或藥師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

症狀	處理方法
過敏反應：(癢癢或蕁麻疹、臉或手腫脹、嘴或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難)。 改變排尿量或排尿頻率。 胸痛；突然或嚴重的頭痛。 幻聽、幻覺；嚴重的嗜睡、躁動不安或混亂。	請立即停藥就醫
頭暈；背痛；便秘、腹瀉、嘔吐或胃痛；感到好鬥或沮喪；輕微頭痛；疲倦或虛弱；體重增加。	症狀嚴重或持續時，請告知醫師