

## Furosemide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Furosemide	Rosis®	樂泄錠	40 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 利尿：可以將體內多餘的水和鹽份經尿中排出，可緩解心臟衰竭、肝、腎疾病引起的水腫。
2. 治療高血壓。

◆ **用量與用法：**

請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥、其所含賦形劑、sulfonamides 類藥品(如 Baktar® 撲菌特錠)過敏者。
2. 無尿症病人。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存於 15-30°C 下，陰涼乾燥避光處所。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥避免和含有酒精成分的飲料一起服用，否則會增加藥品的副作用。
2. 服用本藥後可能會發生嗜睡、頭昏、暈眩。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
3. 服藥後可能有姿勢性低血壓情形發生，即從坐姿或躺姿站起來時，會有頭暈目眩的情形。因此站起來時，應儘可能的放慢速度。
4. 本藥為利尿劑，服用藥物後會增加排尿次數，為避免影響睡眠品質，除非醫師有特別指示，請於晚上 6 點前服用。
5. 服用本藥會增加皮膚對光的敏感性，即使只是短時間，也有可能造成皮膚疹、發癢、紅或曬傷，因此要避免不必要或長時間的日曬並注意防曬。
6. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、有心血管疾病、肝、腎功能不良、胰臟炎、糖尿病、痛風、聽力方面有些許障礙者或紅斑性狼瘡等其他病史，請告知您的醫師。
7. 請告知您的醫師您正在服用的處方或非處方的用藥。
8. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。
9. 請定期至醫院就診及檢查，以維持體內電解質的平衡及定期監測腎功能，以確保藥物療效及用藥安全。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

心律不正常、神智改變、肌肉痙攣或疼痛、不正常出血。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

口乾、視力模糊、頭痛、食欲降低、胃不適、噁心或嘔吐、便秘、虛弱無力、皮膚紅疹或搔癢、黃色視覺。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/04/14 修訂】

BTC00EI08-02