

Domperidone 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Domperidone	Domtoo®	除胃障膜衣錠	10 毫克/錠
Domperidone susp	Wempty® suspension	胃利空懸液劑	60 毫克/60 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療噁心、嘔吐的症狀、胃排空緩慢及食道回流之消化不良。
2. 糖尿病引起的胃腸蠕動異常。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量或頻次。
2. 胃利空懸液劑服用前請先震搖均勻，呈均勻懸浮液後再服用。
3. 請於飯前 15~30 分鐘服用本藥，可增加藥品的身體可用率。
4. 制酸劑會降低本藥的吸收，若與制酸劑併用，制酸劑請於飯後使用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。
2. 患有釋出泌乳激素腦下垂體腫瘤之病患。
3. 刺激胃腸蠕動可能造成危險時，如胃腸道出血、腸穿孔或阻塞等。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 可能影響運動協調性，若出現肌肉控制力下降或失去平衡，請立即停藥就醫。
2. 小兒投與也可能會有椎體外症狀(影響運動協調性)、意識障礙、痙攣發生，不建議一歲以下的嬰兒使用，三歲以下的幼兒應避免超過 7 天的連續使用。
3. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、有心臟衰竭、心律不整等心臟血管疾病、肝、腎疾病等病史，請告知您的醫師。
4. 若有正在服用多巴胺作用劑(如 Bromocriptine)、抗生素、抗黴菌藥、抗心律不整藥或其他的處方和非處方用藥，請告知您的醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請停藥立即就醫

出現肌肉控制力下降或失去平衡而影響運動協調性。意識障礙、痙攣。心跳過慢或心律不整的徵兆或症狀。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、口乾、暫時性的皮疹或發癢、短暫腸胃道痙攣、腹部痙攣、腹瀉、月經不規則。乳汁分泌增加、乳腺痛、漏乳症或男性乳脹：停止用藥後可恢復正常。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/12/1 修訂】

BTC00EK07-02