

Lansoprazole 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lansoprazole	Takepron OD®	泰克胃通口溶錠	30 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍、ZOLLINGER-ELLISON 症候群。
2. 因可抑制胃酸分泌，所以可以治療胃食道逆流性疾病、糜爛性逆流性食道炎，與適當之抗菌劑療法併用，可根除幽門螺旋桿菌。
3. 治療幽門螺旋桿菌引發之消化性潰瘍。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 本藥請整粒吞服，請勿剝半、嚼碎或磨粉。服用時請將藥錠置於舌上待其分解，可喝水或不喝水，直到顆粒可以吞服，通常藥錠不到 1 分鐘便會溶解。
3. 如果病人有吞嚥困難的問題，可將藥粒放入開水中待其溶解後服用。
4. 本藥品和食物併服會降低藥品的吸收力，所以最好在飯前服用。
5. Sucralfate 會降低或延緩本藥的吸收，若併服請在服用 Takepron OD 30 分鐘以後服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其賦形劑或其他 benzimidazole 類藥品(如 Nexium® 耐適恩錠等)過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 含有酒精成分的飲料及辛辣刺激性食物會刺激胃腸道黏膜，服藥期間應避免攝取，以免降低藥效。
2. 本藥含苯丙氨酸，苯酮尿症病患請先告知您的醫師。
3. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
4. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳中的婦女、有肝臟疾病、狼瘡、骨質疏鬆症、維生素 B12 缺乏症、苯丙酮尿症或其他病史者，請告知您的醫師。
5. 若您正在服用 warfarin 或其他處方和非處方的用藥，請告知您的醫師。
6. 應完成療程，沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

皮膚紅疹或癢、嚴重腹瀉、吞嚥困難、胃部腹部疼痛，且可能延伸至背部、眼部四周、口、眼、喉嚨或手部腫脹、呼吸短促、異常出血、異常疲倦伴隨皮膚或眼睛變黃、尿液顏色變深、糞便顏色變白。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/7/20 修訂】

BTC00EK10-02

Lansoprazole 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lansoprazole	Takepron OD®	泰克胃通口溶錠	30 毫克/錠

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、胃部不適、腹痛、便秘或腹瀉、噁心或嘔吐、口乾、脹氣。

