

## Mecobalamin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Mecobalamin	Methycobal®	彌可保膠囊	500 微克/膠囊

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
  1. 治療末梢性神經障礙、因缺乏維生素 B<sub>12</sub> 引起的巨紅細胞性貧血。
- ◆ **用量與用法：**
  1. 遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
  1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：室溫 30°C 下，避光、避濕及避熱(光線會使本藥品的主成分降低)。
  2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
  1. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
  2. 對於從事水銀及其化合物有關之職業者，請避免長期大劑量使用。
  3. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女，或有其他病史，請告知您的醫師。
  4. 請告知您的醫師您現在服用的所有藥品，包含中藥、處方或非處方的用藥。
  5. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
  1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
嚴重過敏。
  2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
胃部不適、食欲不振、噁心、嘔吐、腹瀉。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/5/5 修訂】

BTC00EL04-02