

Gliclazide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Gliclazide	Gluzide®	格汝唐錠	80 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療第二型糖尿病。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 本藥可以剝半，但不可磨粉。本藥須隨餐服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或磺胺類(Sulfonamide)藥物過敏者。
2. 嚴重肝臟或腎臟功能不全者。
3. 曾有糖尿病酮酸中毒者。
4. 胰島素依賴型糖尿病患者。
5. 懷孕者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **注意事項：**

1. 請遵醫囑控制飲食和飲酒量，定期檢查血糖數值及規律的運動。
2. 服用本藥前，若有下列事項請先告知醫師，懷孕或準備懷孕、哺乳、肝臟或腎臟疾病、心血管疾病、甲狀腺疾病、G6PD 缺乏的患者或同時服用其他藥物。
3. 請隨身備有葡萄糖水或其他含糖的食物，預防低血糖。
4. 部分中草藥或健康食品可能會影響血糖值，有需服用此類食品請先告知醫師。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

服用藥後副作用不常發生，但偶爾有

症狀	處理方法
嚴重低血糖昏迷	立即送急診
低血糖症狀(虛弱、昏睡、昏亂、冒冷汗、顫抖、心悸、視力模糊、頭痛、飢餓)	立即吃含糖食物或飲料(糖果或果汁等)，若症狀未改善，則立即送急診
過敏反應(搔癢、蕁麻疹、面部或手部腫脹、口腔或咽喉腫脹或刺痛、胸悶或呼吸困難)、黃色皮膚或眼睛	請停藥，並立即就醫
胃部脹氣、噁心、嘔吐、腸胃及腹部疼痛、腹瀉、消化不良	症狀嚴重或持續時，請告知醫師

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下(30°C)，避光、避濕及避熱。