

Procaterol 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Procaterol	Mecater®	麥咳喘錠	25 微克/錠
Procaterol liquid	Meptin® liquid	滅喘淨液	0.3 毫克/60 毫升/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 治療支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫：使支氣管擴張，呼吸道暢通。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥應盡量避免攝取含麻黃鹼(如市面上的一些減肥藥)或育亨賓成分的中藥或食品，否則會增加藥物的副作用，如精神亢進、失眠、心悸等。
 2. 服用本藥可能會增加血糖值，糖尿病患者應小心監測血糖。
 3. 本藥會抑制過敏原引起的皮膚反應，欲實施過敏原皮膚測試時，須在 12 小時前停藥。
 4. 持續過量使用本劑，可能會造成心律不整，甚至引起心跳停止，所以應小心使用本劑，勿超過建議劑量。
 5. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女，患有心臟血管疾病、肝、腎功能不全、甲狀腺機能亢進、重症氣喘患者或糖尿病等其他病史，請告知您的醫師。
 6. 若有正在服用心臟血管用藥、單胺氧化酶抑制劑(MAO inhibitors：如 Moclobemide)或三環抗憂鬱藥(如 Imipramine)等處方或非處方的用藥，請告知您的醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏、休克、低血鉀(會導致低氧血症)、呼吸困難、心悸、心跳加快、強直性肌肉痙攣。
過量症狀：心搏過速、心搏過速型心律不整、低血壓、焦躁、顫抖、低血鉀及高血糖。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
震顫、頭痛、坐立不安、神經質、失眠、心悸、噁心。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/10/08 修訂】

BTC00EQ09-02