

**Levofloxacin 口服製劑衛教單張**

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Levofloxacin	Cravit®	可樂必妥膜衣錠	500 公絲/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
治療成人因對 levofloxacin 有感受性的致病菌所引起之下列感染：急性鼻竇炎、慢性支氣管炎的急性惡化、社區型肺炎、複雜性尿道感染(包括：腎盂腎炎)，慢性細菌性前列腺炎，皮膚和軟組織感染。
- ◆ **用量與用法：**
  1. 應在服用鐵劑、制酸劑及 sucralfate 前後至少兩小時服用，因為可能發生吸收量下降的情形。
  2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
  3. 即使您開始感覺好轉，也要在整個治療期間使用該藥。如果您過早停止使用該藥，您的感染可能會復發。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 對 Quinolone 類過敏者應避免。
  2. 懷孕及哺乳女性不宜使用。
  3. 曾因使用 Fluoroquinolones 類藥物導致肌腱病變的患者，不宜使用。
  4. 癲癇患者不宜使用。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
  2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
  1. 服藥期間皮膚對陽光會比較敏感，請注意防曬，避免曬傷。
  2. 缺乏 G-6-磷酸去氫酶(蠶豆症)的患者應小心使用。
  3. 本藥可能引起頭暈，因此若預期要開車、從事具危險性的活動、或操作機械時應小心。
  4. 服用本藥，可能會有輕微腹瀉情形發生，若嚴重且持續甚至出血性腹瀉，請告知醫師。未經醫師指示，切勿自行服用止瀉藥。
  5. 本藥可能罕見地會發生肌腱發炎或撕裂(好發於阿基里斯腱，有時為雙側)，可能在開始使用的 48 小時內很快發生，也曾在治療完成的幾個月後發生，尤其是兒童或成長期青少年、老年人、腎功能不良、曾進行器官移植或同時併用皮質類固醇的病人，應謹慎使用。若腳踝後側、肩膀、手或其他關節出現疼痛、瘀傷或腫脹，請告知醫師。。
  6. 若您患有重症肌無力，請先告知醫師。服用此藥的重症肌無力病人，可能會加重症狀的惡化，曾經發生過嚴重的呼吸問題。
  7. 本藥罕見地會誘發癲癇或降低癲癇閾值，有癲癇、中風、腦部疾病病史者，請先告知醫師。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/8/26 修訂】

**Levofloxacin 口服製劑衛教單張**

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Levofloxacin	Cravit®	可樂必妥膜衣錠	500 公絲/錠

8. 本藥品會與部分藥品產生交互作用，若您正在使用下列藥品，請務必告知醫師：抗凝血劑(如 warfarin)、支氣管擴張劑 theophylline、類別 IA 與 III 抗心律不整藥物、三環抗憂鬱藥物、巨環類抗生素、抗精神病藥物、非固醇類抗發炎止痛藥、類固醇等。

**◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏：皮膚起疹、紅斑、水泡、手腳部腫脹、臉部喉嚨腫脹、吞嚥困難、呼吸困難。
- 嚴重且持續腹瀉、血便。
- 心律異常：心跳過快或過慢、不規則、心律不整症狀。
- 肌腱疼痛、腫脹、發炎：腳踝後側、肩膀、手或其他關節出現疼痛、瘀傷或腫脹。
- 精神或行為異常、自殺意念或想法、幻覺、妄想。
- 癲癇發作。
- 週邊神經炎：四肢麻木、刺痛、灼熱感。
- 肝功能異常：食慾降低、噁心、腸胃不適、暗色尿、淺色糞便、皮膚或眼睛變黃。
- 主動脈瘤或主動脈剝離：持續且嚴重的突發性胃痛、胸痛或背痛、咳嗽、呼吸困難。
- 視力減弱、眼睛異常。
- 發燒、喉嚨痛。
- 高血糖或低血糖的症狀：呼吸中帶有水果氣味、頭昏、呼吸急促、心動過速、意識惑亂、嗜睡、感覺虛弱無力、潮紅、頭痛、口渴感或飢餓感增強、頻尿、顫慄或出汗。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

噁心、嘔吐、脹氣、腹瀉、頭痛、頭暈、失眠、肝臟酵素升高。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/8/26 修訂】

BTC00EC12-02