

Nicorandil 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Nicorandil	Sigmat [®]	喜革脈錠	5 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 狹心症之治療。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品或其所含賦形劑過敏者。

2. 同時服用威而鋼 (Viagra)、威而壯 (Levitra)、犀利士 (Cialis)。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服藥期間請避免飲酒。

2. 服用本藥後可能會發生頭昏、暈眩，不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。

3. 快速的變換姿勢，從臥姿或坐姿起立，可能會發生姿勢性低血壓，若要起立請放慢動作緩慢的起身。

4. 您開始服用此藥時可能會頭痛。通常此現象會隨時間改善。請勿因此而停藥或減少服藥量，若頭痛劇烈無法忍受，請回診告知醫師。

5. 若您已 65 歲或以上，使用此藥時須小心。您可能會出現更多副作用。

6. 本藥代謝後可能會導致亞硝酸鹽的生成，使 G6PD 缺乏者發生高鐵血紅蛋白血症，造成人體組織缺氧，輕者症狀為頭暈、頭痛或噁心，可能伴隨指甲、嘴唇和耳朵等處的皮膚變色，重者可能造成呼吸困難、癲癇、昏迷甚至死亡。G6PD 缺乏者應謹慎使用本藥。

7. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、肝功能異常、青光眼等其他病史，請告知您的醫師。

8. 若您正在服用其他硝酸鹽類(如 Isobide[®] 易適倍錠、Ibimo[®] 愛彼脈持續性藥效膜衣錠、Nitrostat[®] SL 耐絞寧錠)等其他處方或非處方的用藥，請告知您的醫師。

9. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請停藥且立即就醫

過敏、眼睛或皮膚變黃(黃疸現象發生)、口內、舌、肛門、消化道潰瘍。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、頭暈、疲倦、睡眠障礙、噁心、食慾不振、腹瀉、胃痛、皮膚潮紅、心悸。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/10/19 修訂】

BTC00EF34-02