

Lacosamide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
lacosamide	Vimpat®	維帕特	100 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
用於治療 4 歲以上兒童及成人的癲癇。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 可搭配或不搭配食物服用
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本品主成份或任何賦形劑過敏者。
 2. 已知患有 2 級或 3 級房室阻斷。
 3. 嚴重肝功能不全者請先告知醫師。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥後可能會發生頭暈、視力模糊或影響動作協調平衡能力。避免開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
 2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心，預防跌倒。
 3. 使用此藥後曾出現與劑量相關的心跳異常的病例，罕見地可能會導致心跳停止，若有傳導或嚴重心臟疾病(如心肌缺氧或梗塞、心衰竭、結構性心臟疾病或心臟鈉離子通道疾病)或有服用會影響心臟傳導的藥物(如抗心律不整藥、鈉離子通道阻斷劑)，請先告知醫師。若有心律不整的症狀，如緩慢、快速或不規則脈搏、心悸、呼吸短促、感覺頭暈或昏厥，請立即就醫。
 4. 如同其他可能用於治療癲癇發作的藥物，此藥物可能有輕微增加自殺想法或行為的風險。對於過去曾有過自殺想法或行為的人，風險會提高。若出現任何新徵兆或惡化徵候，如抑鬱、感到緊張、坐臥不寧或脾氣暴躁；恐慌症發作；或情緒或行為出現其他變化，請告知醫師。
 5. 若無醫師指示，請勿突然停藥，因為出現癲癇發作的風險可能增高。若需停藥，應按醫師指示逐步緩慢地減少劑量直至停用。
 6. 已懷孕、計畫懷孕、哺乳婦、肝腎功能不全、心臟疾病史，請先告知醫師。
 7. 有使用任何處方藥、非處方藥、中草藥、健康食品，尤其是抗心律不整藥、鈉離子通道阻斷劑或其他抗癲癇藥，請先告知醫師。

Lacosamide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
lacosamide	Vimpat®	維帕特	100 毫克/錠

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏：蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊縮；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- 癲癇惡化。
- 心律不整：緩慢、快速或不規則脈搏、心悸、呼吸短促、感覺頭暈或昏厥
- 精神異常：幻覺、抑鬱、感到緊張、坐臥不寧或脾氣暴躁；恐慌症發作；自殺企圖或自殺意念。
- 肝功能異常：疲倦、食慾降低、胃部不適或胃部疼痛、尿色變深、糞便顏色變淺、嘔吐或者皮膚或眼睛泛黃。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、眩暈、頭暈、耳鳴；複視、視力模糊；噁心、便秘或腹瀉；平衡障礙、步態不穩、無力；肌肉痙攣；失眠；記憶障礙、認知障礙、嗜睡、震顫、眼球震顫、感覺異常。