

### Sodium phosphate 口服製劑衛教單張

| 學名               | 商品名                      | 中文名   | 含量/劑型                     |
|------------------|--------------------------|-------|---------------------------|
| Sodium phosphate | Phosphate oral solution® | 含磷口服液 | 磷 30.02 毫克/毫升<br>200 毫升/瓶 |

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
用於治療性聯遺傳性低磷酸鹽性佝僂症或低磷血症。
- ◆ **用量與用法：**
  1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
  2. 避免與含鋁或鎂的制酸劑、樹脂類膽酸結合劑一起服用，因為會降低本藥的吸收。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 腎衰竭、鬱血性心衰竭、愛迪生氏症、不穩定型心絞痛。
  2. 低血鉀、低血鈣、高血鈉、高血磷症。
  3. 先天或後天引起的腸病變、腸阻塞、急性結腸炎、腹水。
  4. 腸胃蠕動差、毒性巨結腸症、胃滯留。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：室溫 15-30°C 下，避光、避濕及避熱。
  2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
  1. 本藥品含鈉，脫水或限制鈉攝取的病人請小心使用。
  2. 可能會有腹瀉情形，如嚴重則考慮停藥。
  3. 發生噁心、嘔吐或腹痛時，不要給予緩瀉劑。
  4. 前3個月曾發生心肌梗塞或動過心臟手術、肝或腎臟疾病史、水腫、慢性發炎性腸道疾病，請先告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
  1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
    - 嚴重過敏：蕁麻疹；皮膚紅腫、起泡或脫皮，可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
    - 電解質異常：情緒變化、意識混亂、肌肉痛或無力、心跳異常、嚴重頭昏或昏厥、心跳過速、口渴感增強、癲癇發作、非常疲倦或虛弱、沒有飢餓感、無法排尿或排尿量改變、口乾、眼睛乾燥或嚴重胃部不適或嘔吐。
    - 胸痛或胸悶。
    - 腎功能異常：無法排尿、排尿量改變、血尿或體重大幅增加。
  2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

胃痛、噁心或嘔吐、腹脹、腹痛、腹瀉。