

Oxcarbazepine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Oxcarbazepine	Trileptal® tab	除癲達膜衣錠	300 毫克/錠
	Trileptal® oral suspension	除癲達口服懸浮液	60 毫克/毫升；100 毫升/瓶

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

1. 控制癲癇或痙攣。
2. 緩解神經痛。

◆ **用量與用法：**

1. 使用之劑量因病及因人而異，請遵循醫師指示服用，勿自行增減或突然停藥。
2. 除癲達口服懸浮液：

- (1) 第一次使用請將所附的塑膠接合器裝入瓶口，並將蓋子蓋回及旋緊以確保接合器完全往下推入瓶子頸部。塑膠接合器保持於瓶口，不用取下。
- (2) 服用前請先振搖均勻，並以內附注射器量筒取用所需劑量。
- (3) 每次服用後，瓶蓋應旋緊，且以乾燥、乾淨的紙巾擦拭注射器外部。



◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對主成分或 eslicarbazepine 或本藥其它賦形劑過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下儲存，避光、避濕及避熱。
2. “除癲達口服懸浮液” 打開藥瓶後請於 7 週內使用完畢，逾時未用畢部份請丟棄。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥避免和含有酒精成分的飲料併服，可能會引起加成的鎮靜作用。
2. 服用本藥有頭暈、嗜睡、運動失調、視力模糊等不良反應發生可能。服藥後在駕駛車輛或操作機械時應謹慎小心。
3. 本藥與 Carbamazepine 極為類似，之前曾因使用 Carbamazepine 而發生過敏或嚴重不良反應者，使用本藥前應先告知醫師並徵詢相關意見。
4. 本藥會降低口服避孕藥的效果，若需避孕請採用其他避孕方法。
5. 不要突然停藥。請依照醫師指示緩慢降低劑量，然後再完全停止服用。若突然停藥，癲癇發作可能會變得更加頻繁。
6. “除癲達口服懸浮液”含山梨糖醇 sorbitol，患有果糖不耐症的罕見遺傳疾病的病人請勿服用。
7. 哺乳中的婦女、有血液方面疾病、精神神經疾病、肝、腎疾病或正在服用其它藥物的患者，請先告知您的醫師。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/12/07 修訂】

BTC00EG09-02

Oxcarbazepine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Oxcarbazepine	Trileptal® tab	除癲達膜衣錠	300 毫克/錠
	Trileptal® oral suspension	除癲達口服懸浮液	60 毫克/毫升；100 毫升/瓶

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏：蕁麻疹；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮（無論是否發燒）；眼睛發紅或刺激；嘴部、喉嚨、鼻子或眼睛出現炎症；雙手、顏面、嘴唇、雙眼、舌或喉嚨腫脹；呼吸困難；吞嚥困難；或嗓音異常嘶啞。
- 低血鈉：頭痛、注意力集中困難、記憶力問題、感到困惑、虛弱、癲癇，或平衡感改變。
- 情緒或行為的變化，包括自殺的念頭或企圖。
- 癲癇發作惡化。
- 噁心、嘔吐、食慾不振、胃痛、皮膚或眼睛發黃、尿液顏色變身、大便顏色變淡。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- 腹痛、噁心、嘔吐、步態異常、運動失調、頭暈、頭痛、眼球震顫、嗜睡、震顫、視覺異常、複視、疲勞。