

Rasagiline mesylate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Rasagiline mesylate	Rakinson®	律莎錠	1 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療巴金森氏症。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥或其賦形劑過敏者。
 2. 重度肝功能損傷者。
 3. 正在服用 dextromethorphan、St. John's wort、cyclobenzaprine、fluoxetine、flvoxamine。
 4. 正在服用或過去 14 天內曾經服用 meperidine、tramadol、methadone、propoxyphene、selegiline。
(請將您目前正在服用的藥物，含處方藥、非處方藥及中草藥，告知醫師或藥師)
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時盡快補服；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 室溫 25°C 以下儲存，避免陽光直射處，避免高濕處如浴室、洗手檯、飲水機旁，避免過熱處如烤箱、電鍋、瓦斯爐旁。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服藥期間請避免食用含有大量乾酪胺(tyramine)的食物，如陳年起司、斯提爾頓乾酪(Stilton cheese)，因可能會引起血壓大幅上升。
 2. 服用本藥後可能會造成眩暈，在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
 3. 開始服藥的前 2 個月比較可能會發生姿勢性低血壓，為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。姿勢性低血壓之副作用會隨時間而緩解。
 4. 請勿在未告知醫師的情況下即突然停藥，因可能會發生體溫升高、肌肉僵硬、知覺異常、自律神經失調等抗精神病藥物惡性症候群。若需停用此藥物，應該按醫師囑咐緩慢停用。
 5. 服用此藥可能造成高血壓或低血壓，請時常監測血壓，注意高血壓或低血壓症狀(嚴重頭痛或頭暈、昏倒、視力改變)。
 6. 本藥可能會加重病患的精神行為異常，例如偏執、精神錯亂、混淆、精神異常、焦慮、妄想和幻覺，有精神疾病者請小心使用。
 7. 若正在服用處方藥、非處方藥和中草藥，尤其是抗憂鬱藥、止痛藥、非類固醇類消炎藥、咳嗽或感冒藥、減肥藥、興奮劑，請先告知醫師。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/12/3 修訂】

BTC00EG18-02

Rasagiline mesylate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Rasagiline mesylate	Rakinson®	律莎錠	1 毫克/錠

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏：蕁麻疹、皮膚紅腫、起泡、脫皮；呼吸困難、說話或吞嚥困難；舌、嘴唇或臉部腫脹。
- 血清素症候群：
 - 行為上和認知/心理狀態的改變：混淆、輕躁症、幻覺、不安、譫妄、頭痛和昏迷。
 - 自主神經反應：暈厥、顫抖、發汗、發燒/體溫過高、高血壓、低血壓、心搏過速、噁心、腹瀉。
 - 軀體效應：肌肉僵硬、肌躍症、肌肉痙攣、以腸道抽筋為主的過度反射、震顫。
- 皮膚腫塊或增生、痣的顏色或大小的變化。
- 抗精神病藥物惡性症候群：發燒、肌肉痙攣或僵硬、頭昏、嚴重頭痛、意識惑亂、思維改變、心跳快速或異常，或是大量出汗。
- 精神行為異常：偏執、精神錯亂、混淆、精神異常、焦慮、妄想、幻覺、難以控制的強烈欲念（例如食欲、賭博、性或花錢）。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、眩暈、類流感症狀、鼻炎、姿勢性低血壓、肌肉骨骼疼痛、脖子疼痛、憂鬱。