

Dapagliflozin 口服製劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 含量/劑型 |
|---------------|----------|--------|---------|
| Dapagliflozin | Forxiga® | 福適佳膜衣錠 | 10 毫克/錠 |

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 用於治療第二型(非胰島素依賴型)糖尿病：配合飲食和運動，以改善血糖控制、預防心血管事件及降低慢性腎臟病新發生或惡化的風險。
2. 可降低心衰竭病人的心血管死亡和心衰竭住院的風險。
3. 用於治療有惡化風險之慢性腎臟病的成人，可降低持續性腎絲球過濾率下降、末期腎病、心衰竭住院和心血管死亡的風險。

◆ **用量與用法：**

請遵循醫師處方服用，隨餐或空腹服藥皆可。切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥嚴重過敏反應病史
2. 嚴重腎功能不全、末期腎病或透析患者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 開始使用本藥可能會發生症狀性低血壓，尤其是腎功能不全、老年或使用環利尿劑 (loop diuretics) 的患者，請定期量測血壓並注意頭暈等低血壓症狀。
2. 服用本藥可能會增加尿路感染或生殖器真菌感染的風險，如有頻尿、排尿困難、發燒、生殖器感染的症狀，請回診就醫。
3. 使用本藥會增加體內水分的排除，可能會造成脫水的情況，所以需要適時補充水分。
4. 本藥可能罕見的造成酮酸中毒，即使血糖未升高，若發生噁心、嘔吐、腹瀉、疲倦、呼吸困難，請立即停藥就醫。
5. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血糖。
6. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。
7. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
8. 若有要懷孕或哺乳的女性請告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏：癢癢或蕁麻疹、臉或手部腫脹或紅腫、胸悶、呼吸困難。
- 尿路感染：血尿、排尿燒灼感或疼痛、頻尿、發燒、下腹疼痛或骨盆疼痛。
- 女性生殖器感染：陰部搔癢或異樣分泌物。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/11/22 修訂】

BTC00EM25-02

Dapagliflozin 口服製劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 含量/劑型 |
|---------------|----------------------|--------|---------|
| Dapagliflozin | Forxiga [®] | 福適佳膜衣錠 | 10 毫克/錠 |

- 男性生殖器感染(龜頭炎、龜頭包皮質)：陰莖疼痛、腫脹、皮疹或分泌物
- 酮酸中毒：意識混亂；呼吸急促；心悸、心跳異常；嚴重胃痛、胃部不適或嘔吐；嚴重嗜睡；感到極度疲倦或虛弱。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

減少飲食或體液喪失(脫水)、鼻咽炎、症狀性低血壓。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/11/22 修訂】

BTC00EM25-02