

Ipratropium Br 吸入製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ipratropium Br	Atrovent® inh.	定喘樂單一劑量吸入液	500 微克/2 毫升/支

- ◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
可以擴張支氣管改善呼吸問題，用於治療慢性阻塞性支氣管炎、支氣喘氣喘。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 僅可透過氣霧器將此藥液吸入肺部。
 2. 市面上有數種氣霧器，使用前請詳閱說明書，依說明書之操作步驟來使用及清潔。
 3. 藥物放入氣霧器之儲藥杯後通常需再加稀釋液稀釋，請依醫師指示加入適當的稀釋液至適當的濃度及體積(通常是加生理食鹽水至總體積為 4-5ml)。
 4. 非一次性使用之儲藥杯及氣霧器零件，每次使用完畢應以無菌水或蒸餾水沖洗乾淨並自然風乾，以降低感染風險。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
對 ipratropium、阿托品及其衍生物(如 tiotropium、oxitropium)或本品之任一成分過敏者。
- ◆ **忘記用藥時該如何處理？**
想起時儘快服用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，不可使用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 存放於攝氏 30°C 以下陰涼處，避免陽光直射、遠離濕氣及過熱的地方。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 與其它吸入劑相同，本藥可能反常性的引起支氣管痙攣，若發生喘、呼吸困難，請立即停藥就醫。
 2. 應避免藥液噴到眼睛，曾有個案因噴到眼睛發生散瞳、眼內壓增加、狹角性青光眼、眼睛疼痛等。
 3. 本藥品可能會造成頭暈或視力模糊，如有此症狀請勿從事駕車、操作重機械或危險活動。
 4. 眼睛疼痛或不適、視力模糊、虹暈幻視(visual halos)或有色影像伴隨結膜充血的紅眼睛及角膜水腫等，可能是急性狹角性青光眼的徵兆，若出現這些症狀請立即就醫。
 5. 已有尿道受阻(如前列腺肥大或膀胱頸阻塞等)的患者，使用本藥可能會惡化排尿困難的情形，若發生請回診告知醫師。
- ◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏。
 - 支氣管痙攣、喘、呼吸困難。
 - 快速、劇烈或不規則的心跳。
 - 眼睛疼痛、視力模糊、視覺有光暈或彩色影像
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭痛、眩暈、喉嚨刺激、咳嗽、口乾、便秘、腹瀉、心悸、噁心、嘔吐、尿液滯留。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/11/30 修訂】

BTC00EQ21-02