

## Ipratropium Br / Salbutamol sulfate 吸入製劑衛教單張

| 學名   | 商品名             | 中文名        | 含量/劑型    |
|--|-----------------|------------|----------|
| Ipratropium Br 0.5 毫克<br>Salbutamol sulfate 2.5 毫克 | Combivent® inh. | 冠喘衛單一劑量吸入液 | 2.5 毫升/支 |

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

可以擴張支氣管改善呼吸問題，用於治療慢性阻塞性疾病併發的可逆性支氣管痙攣。

◆ **用量與用法：**

1. 僅可透過氣霧器將此藥液吸入肺部，不可口服或注射。
2. 市面上有數種氣霧器，使用前請詳閱說明書，依說明書之操作步驟來使用及清潔。
3. 藥物放入氣霧器之儲藥杯後可能需再加稀釋液稀釋，請依醫師指示加入適當的稀釋液至適當的濃度及體積（通常是加生理食鹽水至總體積為 4-5ml）。
4. 非一次性使用之儲藥杯及氣霧器零件，每次使用完畢應以無菌水或蒸餾水沖洗乾淨並自然風乾，以降低感染風險。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對 atropine 或其衍生物(如 ipratropine、tiotropium)或本品之任一成分過敏者。
2. 肥大阻塞性心肌病變或心搏過速性心律不整的病人。

◆ **忘記用藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，不可使用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 存放於攝氏 30°C 以下陰涼處，避免陽光直射、遠離濕氣及過熱的地方。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 與其它吸入劑相同，本藥可能反常性的引起支氣管痙攣，若發生喘、呼吸困難，請立即停藥就醫。
2. 應避免藥液噴到眼睛，曾有個案因噴到眼睛發生散瞳、眼內壓增加、狹角性青光眼、眼睛疼痛等。
3. 眼睛疼痛或不適、視力模糊、視野出現光暈或有色彩、伴隨因結膜充血而造成的紅眼及角膜水腫等，可能是急性狹角性青光眼的徵兆，若出現這些症狀請立即就醫。
4. 本藥品可能會造成頭暈或視力模糊，如有此症狀請勿從事駕車、操作重機械或危險活動。
5. 已有尿道受阻(如前列腺肥大或膀胱頸阻塞等)的患者，使用本藥可能會惡化排尿困難的情形，若發生請回診告知醫師。
6. 本藥可能罕見地引起心肌缺血，患有嚴重心臟疾病(如缺血性心臟疾病、心搏過速或嚴重心臟衰竭)者應小心使用，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難等症狀請立即就醫。
7. 本藥的 salbutamol 成份可能會使物質濫用的檢驗，如運動員的禁藥檢測，呈陽性。
8. 控制不佳的糖尿病、最近發生心肌梗塞、嚴重心臟或血管病變、甲狀腺機能亢進、親鉻細胞瘤、可能罹患狹角性青光眼、前列腺肥大或膀胱頸阻塞，請先告知醫師。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/12/2 修訂】

BTC00EQ22-02

### Ipratropium Br / Salbutamol sulfate 吸入製劑衛教單張

| 學名   | 商品名             | 中文名        | 含量/劑型    |
|--|-----------------|------------|----------|
| Ipratropium Br 0.5 毫克<br>Salbutamol sulfate 2.5 毫克 | Combivent® inh. | 冠喘衛單一劑量吸入液 | 2.5 毫升/支 |

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏。
- 支氣管痙攣、喘、呼吸困難。
- 胸悶、胸痛、呼吸困難。
- 快速、劇烈或不規則的心跳。
- 眼睛疼痛、視力模糊、視覺有光暈或彩色影像

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、眩暈、喉嚨刺激、咳嗽、口乾、便秘、腹瀉、噁心、嘔吐、尿液滯留、顫抖、緊張。