

Dexamethasone 口內膏衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Dexamethasone	Zine orabase	親平口內膏	0.1% ; 5 克/支

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 主成份為抗發炎的類固醇，可塗覆於口腔傷口，保護並減輕患部疼痛。

◆ **用量與用法：**

1. 以棉花棒沾取適量藥膏塗佈於患部，請勿用力磨擦。
2. 使用前可先以棉花棒將傷口附近的口水吸乾，增強藥膏之附著性。
3. 盡量選擇口腔活動較少的時候塗藥，如刷牙後、睡前、不用說話時。
4. 使用後請將黏附於管口及週邊的藥膏擦拭乾淨，並蓋上帽蓋鎖緊保存。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分過敏者。
2. 口腔有結核性、病毒性或其他化膿性感染者。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存於室溫 25°C 以下陰涼處，避免陽光直射。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥不可用於眼部。
2. 使用後短時間內請勿進食或飲水，以免藥膏自患部脫落。
3. 除非醫師指示，本藥請勿使用於感染引起的口腔潰瘍，因感染可能會加劇。
4. 使用 7 天後若患處無顯著改善，請回診請醫師重新評估。
5. 使用本藥治療期間可能會發生真菌或細菌感染，若傷口惡化、口腔內出現紅點、白斑等症狀發生，請停藥回診。
6. 肺結核、胃潰瘍、糖尿病病人，未經醫師診治請勿自行使用。

◆ **可能引起的副作用：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏反應。
 - 口腔感染。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
灼熱感、搔癢、刺激感、疼痛。