

## Timolol maleate 眼藥製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Timolol maleate	Timoptol 0.5%	青眼露滅菌眼藥水	0.5% ; 5 毫升/瓶
	Timoptol XE soln	青眼露長效型點眼液劑	0.5% ; 2.5 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 用於治療青光眼或降低眼內壓。

◆ **用量與用法：**

1. 使用前請先將手洗淨擦乾。
2. 打開瓶蓋，將眼藥瓶反轉振搖 1 次(無須振搖超過 1 次)，頭部往後仰或平躺。
3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將眼藥水點在眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染。
4. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。
5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
6. 若需點兩種以上眼藥水時，青眼露長效型點眼液劑請後點，相隔 10 分鐘以上再重複上述步驟點青眼露長效型點眼液劑。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分過敏者。
2. 反應性氣道疾病、氣喘、氣喘病史、嚴重慢性阻塞性肺部疾病者。
3. 竇性心搏過慢、竇房傳導阻滯、二度或三度房室傳導阻滯、明顯心衰竭、心因性休克。

◆ **藥品儲存：**

1. 應儲存於室溫 30°C 以下陰涼處，避免陽光直射。
2. 開瓶使用後只能存放 1 個月，1 個月後未用畢請丟棄。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 點藥前需取出隱型眼鏡，點藥後至少要隔 15 分鐘再戴上，若使用長效的青眼露長效型點眼液劑需間隔 30 分鐘以上再戴上。
2. 青眼露長效型點眼液劑與其他眼藥水併用時，其他眼藥水需先點，至少間隔 10 分鐘以上再投與青眼露長效型點眼液劑。
3. 給藥後可能會持續 30 秒至 5 分鐘的視力模糊，開車或做其他需要有清楚視力的工作時，請小心使用。
4. 此藥可能會隱藏低血糖症狀。若您患有高血糖(糖尿病)，您需要密切關注您的血糖。
5. 此藥物讓您難以判別是否出現甲狀腺功能亢進的症狀，如心動過速。若您患有甲狀腺亢進疾病，請先告知醫師，無醫師指示請勿自行停用藥物。
6. 本藥可能會導致眼睛乾澀，患有角膜疾病者應小心使用。
7. 本藥可能會加重重症肌無力的症狀，重症肌無力患者應小心使用。
8. 若您有眼睛受感染、受傷或將接受眼睛手術的情形，請告知醫生。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/11/11 修訂】

BTC00EV17-02

### Timolol maleate 眼藥製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Timolol maleate	Timoptol 0.5%	青眼露滅菌眼藥水	0.5% ; 5 毫升/瓶
	Timoptol XE soln	青眼露長效型點眼液劑	0.5% ; 2.5 毫升/瓶

9. 有心血管疾病、肺部疾病、糖尿病、甲狀腺疾病、過敏史，請先告知醫師。

◆ **可能引起的副作用：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 過敏：蕁麻疹、局部或全身性皮炎、臉部或嘴唇腫脹、吞嚥或說話困難、呼吸困難。
- 支氣管痙攣、呼吸困難、心跳過慢、心跳停止。
- 呼吸短促、體重明顯增重、或雙手或雙腿腫脹。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

眩暈、頭痛、眼部刺激、灼熱感、刺痛感、乾眼。