

Carteolol HCl 眼藥製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Carteolol HCl	Mikelan LA	大塚美特朗持續性點眼液 2%	2% ; 2.5 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 用於治療青光眼或降低眼內壓。

◆ **用量與用法：**

1. 使用前請先將手洗淨擦乾。

2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。

3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將眼藥水點在眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染。

4. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。

5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。

6. 若需點兩種以上眼藥水時，本藥請後點，其他眼藥水點完，相隔 10 分鐘以上再重複上述步驟點本藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分過敏者。

2. 曾患有或出現支氣管氣喘、支氣管痙攣症狀或嚴重慢性肺阻塞者。

3. 控制不佳的心不全、竇性心搏過慢、二級或三級房室阻斷、心原性休克患者。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存於室溫 25°C 以下，避光儲存。

2. 開瓶使用後只能存放 1 個月，1 個月後未用畢請丟棄。

3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 點藥前需取出隱型眼鏡，點藥後至少要隔 30 分鐘再戴上。

2. 本藥因含有 Alginic acid，可延長其有效成份停留在眼睛表面的時間，若與其他眼藥水併用時，本藥可能會影響其他眼藥水的吸收，或其他眼藥水可能影響本藥停留在眼睛表面的時間，因此其他眼藥水需先點，至少間隔 10 分鐘以上再投與本藥。若本藥需先點，請在有充分時間間隔後，再使用其他眼用製劑。

3. 點眼後可能會有短暫的視力模糊，開車或做其他需要有清楚視力的工作時，請小心使用。

4. 此藥可能會隱藏低血糖症狀。若您患有高血糖(糖尿病)，您需要密切關注您的血糖。

5. 此藥物讓您難以判別是否出現甲狀腺功能亢進的症狀，如心動過速。若您患有甲狀腺亢進疾病，請先告知醫師，無醫師指示請勿自行停用藥物。

6. 若您有眼睛受感染、受傷或將接受眼睛手術的情形，請告知醫生。

7. 有心血管疾病、肺部疾病、糖尿病、甲狀腺疾病、過敏史，請先告知醫師。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/11/11 修訂】

BTC00EV18-02

Carteolol HCl 眼藥製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Carteolol HCl	Mikelan LA	大塚美特朗持續性點眼液 2%	2% ; 2.5 毫升/瓶

◆ **可能引起的副作用：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 過敏：蕁麻疹、局部或全身性皮疹、臉部或嘴唇腫脹、吞嚥或說話困難、呼吸困難。
- 支氣管痙攣、呼吸困難、心跳過慢、昏厥、心跳停止。
- 呼吸短促、體重明顯增重、或雙手或雙腿腫脹

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭暈、頭痛、視力模糊、搔癢、乾眼、結膜充血、眼部刺激、灼熱感、刺痛感。