

## Brimonidine 眼藥劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Brimonidine	Alphagan P	艾弗目 P 無菌眼用液劑 0.15%	0.15% ; 5 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 用於治療青光眼或降低眼內壓。

◆ **用量與用法：**

1. 使用前請先將手洗淨擦乾。

2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。

3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將眼藥水點在眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染。

4. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。

5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。

6. 若需點兩種以上眼藥水時，請相隔 5 分鐘以上再重複上述步驟點第二種眼藥水。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分過敏者。

2. 同時服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)。(請將您正在使用的藥物告知醫師或藥師)

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存於室溫 25°C 以下陰涼處，避免陽光直射。

2. 開瓶使用後只能存放 1 個月，1 個月後未用畢請丟棄。

3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 點藥前需取出隱型眼鏡，點藥後至少要隔 30 分鐘再戴上。

2. 用藥後可能會引起倦怠感、或嗜睡，駕車、從事危險性活動或工作時，應注意可能有注意力和警覺性降低等的問題。

3. 若您有眼睛受感染、受傷或將接受眼睛手術的情形，請告知醫生。

4. 本藥可能會影響血壓，患有重度心血管疾病者應小心使用。

5. 憂鬱症、腦血管或冠狀血管機能不全、雷氏症候群、姿態性低血壓、或血栓性閉鎖性血管炎患者，請先告知醫師。

◆ **可能引起的副作用：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 過敏：蕁麻疹、局部或全身性皮疹、臉部或嘴唇腫脹、吞嚥或說話困難、呼吸困難。
- 視力改變、眼睛疼痛或嚴重眼睛刺激。
- 眼瞼紅、腫、痛。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

過敏性結膜炎、結膜充血、結膜毛囊炎、眼睛搔癢、燒灼感、口乾、嗜睡、視覺模糊、高血壓。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/11/11 修訂】

BTC00EV19-02